UNITE UN
INTRODUCTION

1.1. Objectifs et utilisation du module

On sait depuis de nombreuses années que la taille et le poids de la mère sont étroitement liés au poids de naissance de l'enfant et que les suites de la grossesse comme la mortalité périnatale, un faible poids à la naissance et un retard de croissance sont souvent dues à une malnutrition chronique pendant la grossesse.

pédagogiques appropriés (les modules) est indispensable. Le présent module vise à combler les lacunes et à faciliter les activités de l'équipe du centre de soins. Les étudiants en Sciences de la Santé, les instructeurs et les professionnels confirmés peuvent utiliser ce module pour améliorer la nutrition maternelle où qu'ils se trouvent.

1.2. Consignes

Répondez aux questions du test préliminaire.

Etudiez le module central et assurez-vous que vous avez compris l'épidémiologie, les causes, la prévention et la prise en charge de la nutrition

UNITE DEUX

MODULE CENTRAL

2.1. Test préliminaire

1. La nutrition de la mère est affectée par :
   a) Les revenus
   b) La culture
   c) Des activités physiques excessives
   d) Toutes les réponses ci-dessus
   e) Aucune des réponses ci-dessus
2. L'une des réponses ci-dessous n'affecte pas la nutrition de la mère
   a) La race
   b) La grossesse
   c) La lactation
   d) La digestion
3. La femme enceinte doit prendre _____ de plus qu'une femme qui n'est pas enceinte. (Complétez)
   a) 150 kcal/jour
   b) 350 kcal/ jour
   c) 1000 kcal/ jour
   d) Aucune des réponses ci-dessus
4. La/Les cause(s) importante(s) de malnutrition chez la femme inclut/incluent les réponses suivantes sauf :
   a) L'ignorance
   b) Une distribution inégale de la nourriture disponible
   c) Une maladie infectieuse
   d) Un apport insuffisant d'aliments nécessaires
   e) Toutes les réponses ci-dessus
   f) Aucune des réponses ci-dessus
5. Un apport insuffisant est dû à :
   a) Un manque de production de nourriture
   b) L'incapacité des familles à acheter la nourriture disponible sur le marché
   c) Une mauvaise communication
   d) Un changement de conditions climatiques
   e) Toutes les réponses ci-dessus
   f) Toutes les réponses ci-dessus sauf C

6. Les réponses ci-dessous constituent les causes sous-jacentes de retard de développement fœtal sauf :

a. Une nutrition maternelle déficiente
b. Une anémie
c. Une maladie aigüe ou chronique
d. Aucune de ces réponses

7. Quelle intervention en matière de méthode de nutrition est la moins pratiquée en Ethiopie ?

a. La fortification des aliments
b. La politique des prix
c. La supplémentation
d. L'éducation à la nutrition

8. L'une des réponses ci-dessous n'est pas une mesure anthropométrique

a. Le poids
b. La taille
c. L'épaisseur du pli cutané
d. Les analyses biochimiques

9. Quelle réponse aide à détecter une malnutrition chronique (retard de développement) ?

a. Le poids pour une taille donnée
b. La taille pour un âge donné
c. Le poids pour un âge donné
d. Toutes les réponses ci-dessus

10. L'ajout d'un ou plusieurs nutriment(s) essentiel(s) dans les aliments qui sont produits de façon centralisée et couramment consommés au sein d'une communauté donnée dans le but de prévenir une carence s'appelle :

a. La fortification
b. La supplémentation
c. La complémentation
d. Toutes les réponses ci-dessus

11. Les problèmes liés à une carence en iode peuvent être prévenus à une échelle nationale par :

a. Une supplémentation sous forme de gélule d'iode
b. Une iodation universelle du sel
c. Des injections d'iode
d. Toutes les réponses ci-dessus

12. Quelle(s) réponse(s) n'est/ne sont pas une conséquence de la malnutrition maternelle ?

a. Une infection
b. Une faible productivité
c) Une baisse de la fonction immunitaire
d) Aucune des réponses ci-dessus

13. Les causes d'anémie incluent :

a. La carence en fer
b. L'ankylostome
c. Le paludisme
d. Toutes les réponses ci-dessus

14. Quelle(s) affirmation(s) est/ sont vraie(s) à propos de la femme infectée par le VIH si elle est bien nourrie :

a. La progression vers le SIDA est ralentie

b. Le poids corporel et la force sont maintenus

c. La réponse aux antirétroviraux est meilleure

d. Toutes les réponses ci-dessus

15. Quelle affirmation est vraie à propos de la malnutrition maternelle ?

a. Les glucides sont la seule source calorique pour les mères allaitantes
b. Les besoins nutritionnels des femmes qui allaitent sont supérieurs à ceux des femmes enceintes
c. La vitamine A doit être donnée de façon systématique à toutes les femmes enceintes
d. Aucune des réponses ci-dessus

16. Le gain de poids normal pendant la grossesse est de :

a. 3,5kg

Le porc peut être interdit pour des raisons religieuses et culturelles.

Il existe une discrimination dans la distribution de nourriture entre les membres de la famille ; les hommes adultes (chefs de famille) mangent avant les femmes, et les enfants reçoivent les restes de nourriture.

Economie : La nature et la quantité de nourriture consommée pendant la grossesse et l'allaitement dépendent des revenus de la famille.

Sexe : Dans la famille et la communauté, les femmes ont une moindre reconnaissance sociale, donc elles reçoivent une alimentation de moindre qualité et en moindre quantité.

Grossesse et allaitement

Le régime alimentaire de la femme enceinte et allaitante doit présenter une augmentation substantielle de l'apport en calories, en protéines, en calcium, en acide folique et en fer. Les femmes enceintes qui risquent particulièrement des déficits nutritionnels sont les adolescentes, les femmes en sous-poids, les femmes obèses, celles qui ont des problèmes nutritionnels chroniques, celles qui fument ou prennent de l'alcool ou des drogues, celles dont les revenus sont faibles et celles qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète ou l'anémie.

Habitudes alimentaires

Les habitudes alimentaires sont très individuelles et déterminées par les préférences personnelles, par exemple :

- Les femmes enceintes sont peu motivées à faire la cuisine et prendre leurs repas seules.
- Mélange d'aliments, par exemple. Injera et Wat à partir de céréales, de légumineuses, de légumes et autres.
- Consommation de céréales sous la forme kolo (rôties) et nifro (bouillies).
- Consommation d'inset (fausse banane) qui prévient la constipation.
- Consommation de lait de chamelle dans les zones pastorales.
- Consommation de légumes et céréales crus.

La planification d'une alimentation qui réponde aux besoins spécifiques commence par les femmes enceintes, les mères qui allaitent, les jeunes enfants et les adolescents.

La malnutrition infantile commence souvent dès la conception. Lorsque les femmes enceintes ont des régimes alimentaires inadéquats, des charges de travail excessives, ou sont fréquemment malades, elles donnent naissance à des bébés plus petits avec une multitude de problèmes de santé. Les enfants nés de mères malnutries ont plus de risques de mourir pendant la petite enfance. S'ils survivent, ils peuvent avoir des lésions permanentes avant la fin de leur seconde année. C'est la raison pour laquelle les femmes enceintes, celles qui allaitent et les enfants de moins de deux ans doivent constituer des groupes-cibles prioritaires pour toute intervention nutritionnelle. Les effets de la malnutrition dans la prime enfance persistent tout au long des années de formation et même jusqu'à l'âge adulte, diminuant la productivité et la qualité de vie. Des femmes petites à l'âge adulte qui ont été mal nourries lorsqu'elles étaient enfants ont plus de risque de donner naissance à des bébés petits, et ainsi le cycle de la malnutrition et de la maladie se perpétue.

2. 5. Rôle de la nutrition maternelle dans la promotion de la santé maternelle

L'état physiologique de la mère, en particulier la physiologie de la reproduction au moment où débute la grossesse, a une influence considérable sur le développement du fœtus. Plusieurs études prouvent la relation entre la taille à l'âge adulte, l'efficacité reproductive et le statut socio-économique. En général, le bébé d'une femme petite pèse moins, a moins de vitalité et a des chances de survie plus faibles que celui d'une femme grande. Le retard de développement chez la mère ne peut pas être corrigé par un bon régime alimentaire pendant la grossesse et il en est de même pour l'efficacité de la reproduction.

Le développement du fœtus peut être considéré comme la résultante de l'interaction entre son potentiel génétique et l'environnement intra-utérin. Les femmes qui débutent une grossesse en bon état de physiologie reproductive et qui n'ont pas souffert de mauvaise santé ou de privation nutritionnelle pendant l'enfance mettront au monde des bébés plus gros et en meilleure santé que celles qui ne bénéficient pas de tels avantages.

Nos connaissances en matière de besoins nutritionnels maternels proviennent d'un grand nombre d'études. La relation entre les apports alimentaires chez la mère et leurs effets dans sa

descendance s’observe parfaitement dans les expériences sur les animaux, en particulier dans

Encouragez la femme enceinte à consommer des aliments riches en fibres et beaucoup de liquides pour éviter la constipation.

Mettez au rang de priorité l’aide à apporter aux adolescentes enceintes pour

Alimentation insuffisante

Infections fréquentes

3.2. Enfance (2 à 9 ans)

Alimentation insuffisante

Attention sanitaire insuffisante

Mort fœtale et néonatale accrue

Retard de croissance intra-utérine

Faible poids à la naissance

Accouchement prématuré

Fonction immunitaire diminuée

Malformations congénitales

Crétinisme et QI réduit

4.3. La famille et la communauté

Hausse des dépenses de ressources (coûts médicaux et sociaux)

Répercussion sur le statut socio-économique

5. Problèmes nutritionnels maternels les plus fréquents

Carence en protéines

Carence en fer

Carence en vitamine A

Carence en iode

Carence en acide folique

Carence en Zinc

Carence en Vitamines B_6 et B_{12}

Malnutrition protéino-calorique

5.1. Malnutrition protéino-calorique

Elle est due à une carence en protides, graisses et glucides dans le régime alimentaire. Le corps se met donc à dégrader la masse musculaire pour fournir l'énergie requise si les glucides manquent pour la production d'énergie.

Conséquences :

Infections

Accouchement dystocique

Mortalité maternelle

Faible poids à la naissance et restriction de croissance fœtale

Mortalité néonatale et infantile

Syndrome d'épuisement maternel

Fatigue

Augmentation des fausses-couches spontanées

5.2. Carence en fer

Forme la plus fréquente de malnutrition

Cause la plus fréquente d'anémie

Autres causes d'anémie : ankylostomes, paludisme

L'anémie est définie aux premier et troisième trimestres comme une concentration en hémoglobine inférieure à 11gm/100ml ou hématocrite inférieur à 33% et au second trimestre par un taux d'hémoglobine inférieur à 10,5gm/100ml or hématocrite inférieur à 32%

Causes de carence nutritionnelle en fer

Apports alimentaires faibles en fer

Faible biodisponibilité du fer alimentaire

Consomma, 3d ( )Tj bT1 1923d ( )Tj (i)6(e)10(ur)7o Td ( )Tj EMC /LBody(i)6(0 Tw

Grossesses rapprochées

Conséquences

Cécité nocturne

Mortalité maternelle accrue

Fausse-couche

Enfant mort-né

Carence pondérale à la naissance

Réduction du transfert de vitamine A au fœtus

Faible concentration en vitamine A dans le lait maternel

5.4. Carence en iode

Causes

Vie en zone montagneuse où les aliments issus de végétaux ont des taux d'iode insuffisants car il y a peu ou pas d'iode dans les sols

Ingestion de tubercules de cassava (manioc) sans en avoir enlevé les toxines et autres agents chélateurs

Pas de consommation de sel marin

Pas de consommation de sel iodé

Conséquences

Altération des facultés cognitives

Capacité d'étude réduite

Crétinisme endémique

Goitre

Fausse-couche

5.5. Carence en Zinc

Causes

Conditions qui diminuent la biodisponibilité comme les phytates et les fibres alimentaires et augmentent l'excrétion du zinc

Faible apport en zinc dans le régime alimentaire

Conséquences

Rupture prématurée de la poche des eaux

Accouchement prolongé

Accouchement prématuré

Carence pondérale à la naissance

Mortalité maternelle et infantile

7. *Restrictions alimentaires*

Régime et jeûne chroniques peuvent entraîner un retard de développement fœtal.

La boulimie et l'anorexie mentale représentent des formes extrêmes de restriction

2.9. Cercle vicieux de malnutrition et pathogénèse du VIH

Figure 2 : ***Cercle vicieux de malnutrition et pathogénèse du VIH***

Une bonne nutrition retarde la progression du VIH vers le SIDA, maintient le poids corporel et la force, et améliore la réponse à la thérapie.

Les médications antirétrovirales (ARV)

1. Régime alimentaire pendant la grossesse et l’allaitement

donne une indication sur l’adéquation de l’équilibre entre les apports caloriques et les besoins métaboliques.

Intérêt

Evaluation anthropométrique de la croissance

Les mesures courantes comprennent :

1. La stature (taille)
2. Le poids corporel
3. Le pli cutané

Indications obtenues à partir de mesures de croissance

1. Poids pour une taille donnée :
   - Index sensible de l’état nutritionnel présent

   Limites :
   - Un

1. Consommation quotidienne quantitative :
    - Rappel ou prise de notes directe conçus pour mesurer la quantité individuelle d'aliments consommés pendant une journée
2. Antécédents nutritionnels et fréquence de prise d'aliments :
    - Information rétrospective sur les habitudes de consommation alimentaire pendant une période plus étendue, définie avec moins de précision (questionnaire)

Rappel sur une période de 24 heures :

- Fondé sur l'interrogatoire
- Rappel de tous les aliments pris pendant les 24 heures ou la journée précédente
- Description détaillée de tous les aliments et boissons, description des méthodes de cuisson et des noms de marque
- Toute prise de vitamines et minéraux sous forme de suppléments doit également être notée
- Convient pour une évaluer la prise moyenne de nourriture et nutriments au sein d'un groupe important.

Limitesen3(ent)2(s)2(s)4( )10(14-0pl)6(i(e)])1c 0 Tw 27.79 01c 9 <</(f)-c1-2niCI-4o2(or)7(m)6(l)258

Méthode clinique

Modifications dans les tissus superficiels ou dans les organes situés près de la surface du corps, qui se voient ou sont facilement repérables à l'examen clinique. Modifications des :

Yeux

Peau

Cheveux

Langue, ongles

Glande thyroïde

Indicateurs courants

Œdème

Dépigmentation des cheveux

Stomat/ Tc -0.:3 EMC /LBoo -0.002 /1J -0.f 0.46 0 Td

Gn/P <</MCID 29 >>BDC /TT2 16 0 Td ( )Tj 05 Tc 0.002 Tw 1.04 0 Trs

P h e v e u x

Tableau 4 : Signes et Symptômes des syndromes de carences

Signe/Symptôme	Anomalie nutritionnelle
Incapacité à voir le soir ou dans la pénombre	

Méthodes d'intervention nutritionnelle

Fortification des aliments

Vivres-contre-travail

Subventionnement

Supplémentation

Planification familiale

Intégration de la nutrition à la santé

Politique des prix

Soins primaires de santé

2.13. Mécanismes des interventions nutritionnelles

Il existe cinq mécanismes principaux dans toutes les interventions

1. Rendre la nourriture disponible au niveau local ou régional, aliments nécessaires plus disponibles en termes de lieu et de temps. Cela comprend :

   Stockage de la nourriture

   Diversification de l'agriculture

   Importation de nourriture

   Jardins communautaires et familiaux

   Plans de production de petit bétail

   Distribution de nutriments spécifiques

   Fortification des aliments

2. Rendre les aliments nécessaires plus accessibles et disponibles pour les ménages. Cela comprend :

   Supplémentation des aliments nécessaires aux enfants d'âge pré-scolaire et scolaire et aux femmes.

   Subventionnement

   Technologie convenable pour la préparation et la conservation des aliments

   Programmes de vivres-contre-travail

   Planification familiale

   Intégration de la nutrition dans les services de santé

Changements techniques dans les pratiques d'agriculture

Programme de coupons alimentaires

Programme de politique des prix

3. Utilisation de la nourriture au niveau du ménage, mieux utiliser les aliments disponibles grâce à la transformation des aliments, par exemple la fermentation, la préparation d'aliments de sevrage. Cela comprend :

Education à la nutrition (en face à face, par les medias)

Promotion de l'allaitement maternel

Composition des aliments

4. Distribution dans le ménage :

Répartition de la nourriture à l'intérieur du ménage

Supplémentation

Education

5. Utilisation physiologique

Activités des services de santé

Soins primaires

Hygiène environnementale

Evaluation physique

Observation générale– L'observation générale fournit des informations importantes sur le statut nutritionnel. Une personne convenablement nourrie doit paraître robuste, pleine de vie et d'énergie et doit se tenir droite, sa peau, ses cheveux et ses ongles doivent avoir l'air sains.

Des informations biochimiques peuvent être utilisées pour confirmer un diagnostic, aider à déterminer les modifications alimentaires nécessaires ou à identifier les carences nutritionnelles spécifiques avant l'apparition de signes cliniques.

Les données de laboratoire le plus couramment utilisées sont l'hémoglobine, les protéines sériques, la transferrine sérique, et la numération totale des lymphocytes, T 3, T 4, TSH, et la thyroxine. Par exemple, un taux d'hémoglobine diminué indique une absorption trop faible de fer ou des réserves de fer trop faibles.

Traiter les infections cliniques

Promouvoir l’utilisation de matériels traités par insecticide

Actions Maternelles

Au cours des deuxième et troisième trimestres, prendre des médicaments antipaludéens 8463[

Prendre en compte l’allaitement dans la prescription de contraception

Actions Maternelles

Mettre en route l’allaitement la première heure après la nai

Passages critiques dans le cycle de la vie

1. Surveillance anténatale

Grossesse : Vaccin anti tétanique et programmes de Conseil et Dépistage Volontaire

Visite anténatale, Fer/Acide folique

Lutte contre les parasites

Former et approvisionner les agents communautaires, encourager les fournisseurs privés à suivre les recommandations appropriées

Mettre en place des actions spécifiques pour atteindre les personnes à traiter, par exemple des journées locales de distribution de micronutriments

Enregistrer et surveiller la mise en œuvre des actions essentielles ; mener une surveillance des problèmes nutritionnels

Au niveau de la communauté

Identifier et soutenir un système pour suivre toutes les femmes enceintes au moins pendant l'accouchement et les premières semaines qui le suivent.

Former et aider les accoucheuses, les groupes de femmes et les autres travailleurs à donner les services nutritionnels clés.

F2f4(e au2(l)6(e)351s)4es 004 Tc-2(una)-5p1-hois le

Soutenir les choix de planification familiale

. Faire prendre conscience aux chefs de communautés et aux familles d Tw 1.5 0 T0[(.)]T pendan l q0.165 Tw Tc 0 Tw 11.36 6/MCI351ser

Gélule d'iode

Une stratégie à court terme dans les régions hautement endémiques consiste à distribuer une dose unique de lipiodol (gélules d'huile iodée) aux populations. Cela les protègera pendant un à deux ans, jusqu'à ce que l'iodation généralisée du sel soit effective.

Posologie : 1 gélule pour la femme enceinte

2 gélules chez les femmes en âge de procréation

Fer et acide folique

La supplémentation est nécessaire ou recommandée pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Les femmes enceintes ont besoin d'une quantité de fer bien supérieure à celle qui est fournie par la plupart des régimes alimentaires et il est donc important qu'elles reçoivent des suppléments de fer. Dans les régions où la prévalence de l'anémie est élevée, la supplémentation doit être poursuivie pendant la période du post-partum pour leur permettre d'acquérir des réserves suffisantes de fer.

Fer : 60 mg/jour et acide folique 400 mg/jour pour une supplémentation généralisée chez les femmes enceintes, celles qui allaitent et les adolescentes.

Fortification des aliments

Fortifier les aliments signifie ajouter un ou plusieurs nutriment(s) nécessaire(s) aux aliments qui sont produits de façon centralisée et mangés régulièrement dans une société donnée. La fortification des aliments est une intervention majeure dans l'effort de réduction des carences en fer, en vitamine A et en iode dans les pays en voie de développement aussi bien que dans les pays développés. Un grand nombre d'aliments et de condiments ont été fortifiés en fer et différentes formes de fer ont été utilisées. Dans un grand nombre de pays d'Amérique Latine et des Caraïbes, y compris le Vénézuela, l'Equateur, le Brésil et la Grenade, les farines de blé et de maïs sont déjà fortifiées en fer et en vitamines B. En Inde, des chercheurs ont joué un rôle essentiel en faisant des recherches sur la fortification du sel et le Chili a utilisé des biscuits fortifiés en hémoglobine séchée ainsi que du lait en poudre non écrémé fortifié en fer et en acide ascorbique dans un programme de cantine scolaire.

Il convient de se centrer sur des aliments de base consommés par tous. De plus, les aliments de sevrage, le pain plat, la poudre de curry, la sauce de poisson et beaucoup de nouilles manufacturées se prêtent bien à la fortification en fer.

2.15. Contrôle et prévention des maladies liées à la carence en iode

Stratégies

Les principales stratégies de maîtrise et d'élimination d'une carence en iode sont :

1. Une iodation généralisée du sel destiné à la consommation humaine et animale
2. Une supplémentation sous forme de gélules d'iode pour les populations vivant dans des régions hautement endémiques

Iodation universelle

Les maladies liées à une carence en iode peuvent être éliminées par une consommation quotidienne de sel iodé. Le sel est utilisé universellement par des personnes appartenant à tous les groupes d'âge, tous les niveaux socio-économiques, toutes les cultures et toutes les religions. Le sel iodé est une mesure à la fois préventive et curative d'une carence en iode et représente la solution à long terme la plus efficace et la moins chère d'un problème majeur de santé. Le sel iodé doit être utilisé de façon quotidienne dans un environnement pauvre en iode et les besoins journaliers pour un adulte sont de 150 microgrammes.

Supplémentation sous forme de gélules d'iode

Une stratégie à court terme dans les régions hautement endémiques consiste à distribuer une dose unique de lipiodol (gélules d'huile iodée) aux populations. Cela les protègera pendant un à deux ans, jusqu'à ce que l'iodation généralisée du sel soit effective.

UNITE TROIS

MODULE SATELLITE

3.1. MODULE SATELLITE

font partie des principales causes de mortalité infantile, la carence en vitamine A est une préoccupation majeure.

Raisons d'entreprendre des actions :

L'amélioration du statut en vitamine A :

Prévient la cécité nocturne, la xérophtalmie, la destruction de la cornée et la cécité

Peut prévenir des maladies congénitales

Prévient les cancers épithéliaux et peut-être d'autres types de cancers

Stratégies

Voici les stratégies principales qui ont été adoptées à l'échelle mondiale pour maîtriser et éradiquer les carences en Vitamine A :

1. Supplémentation
2. Diversification et modification alimentaires
3. Fortification des aliments

Dans les régions où une carence en vitamine A est courante, les femmes en post-partum doivent recevoir une dose unique élevée de Vitamine A (200,000 UI) en gélule aussi vite que possible après l'accouchement. Cela permet de créer des réserves de vitamine A, améliore le contenu en vitamine A du lait maternel et réduit le risque d'infection chez la mère et l'enfant.

Une dose élevée de supplémentation en vitamine A ne doit pas être donnée au cours de la grossesse car elle risquerait de nuire au développement du fœtus. Comme le risque de grossesse est très faible chez les femmes qui allaitent au cours des 45 jours qui suivent l'accouchement, c'est là le seul moment où elles doivent recevoir la gélule fortement dosée.

Le dosage du traitement par vitamine A des femmes en post-partum dans les 45 jours après l'accouchement est de 200,000 UI.

Les agents de santé qui interviennent dans les installations locales et dans les antennes de proximité peuvent administrer les gélules de vitamine A aux femmes. Des volontaires convenablement formés et correctement encadrés, des agents de santé communautaires ou des agents de vulgarisation peuvent administrer la vitamine A pendant des campagnes.

Diversification d'une nourriture riche en vitamine A

La diversification de la nourriture est une stratégie à long terme importante et durable pour la prévention de la carence en vitamine A. Les communautés doivent être encouragées dans tout le pays et tout le temps à cultiver et consommer des aliments riches en vitamine A comme la tomate, le poivron vert, les fruits jaunes et les légumes verts.

Sources animales de vitamine A

Les meilleures sources de rétinol actif préformé, qui est utilisé de la façon la plus efficace par l'organisme, sont les aliments d'origine animale. Cela inclut le jaune d'œuf, les abats comme le foie, le lait entier et les produits laitiers, les petits poissons avec le foie, le poisson, l'huile de foie de morue, le beurre et le ghee.

Sources végétales de vitamine A

Les végétaux contiennent du beta-carotène qui doit être converti en rétinol par l'organisme. Les meilleures sources végétales de vitamine A sont les fruits et les légumes orange ou jaune foncé comme la papaye, la mangue, la citrouille, la carotte, et les patates douces jaunes ou oranges ainsi que les légumes vert foncé comme les épinards, le chou frisé et les blettes. Le légume-feuille appelé « Gommen » est un exemple de légume traditionnel riche en vitamine A couramment compris dans le régime alimentaire Ethiopien.

Fortification en vitamine A

Ceci comprend l'ajout d'une ou plusieurs vitamine(s) aux aliments couramment consommés.
Cette stratégie est bénéfique pour la population tout entière si de nombreuses sortes d'aliments propres à la consommation humaine peuvent être manufacturés et fortifiés au niveau de l'usine. Malheureusement la fortification des aliments n'est pas bien connue en Ethiopie. Des efforts sont en cours pour fortifier le sucre et les huiles produits dans certaines grandes usines.

Carence en fer

Les causes d'anémie sont multiples et les causes principales sont des carences nutritionnelles, qui représentent plus de la moitié des cas. Les autres causes d'anémie incluent les pertes de sang par hémorragie, la destruction des globules rouges par des infections, et des malformations génétiques des globules rouges.

Causes de carence en fer :

Quantité de fer insuffisante dans l'alimentation

Pertes de sang au cours de la menstruation

Lourde charge de parasites intestinaux comme la bilharziose, la trichocéphalose et l'ascaridiose

Conséquences : L'anémie entraîne une capacité de travail réduite, une performance mentale réduite et un manque de résistance aux infections. Lorsque le niveau de concentration en hémoglobine tombe au-dessous de 4g/dl, cela peut provoquer la mort par insuffisance cardiaque due à l'anémie. L'anémie ferriprive peut aussi causer la mortalité maternelle par réaction immunitaire et l'anémie maternelle peut causer la perte du fœtus, un faible poids à la naissance.004

3.1.6. Evaluation de la malnutrition maternelle :

Voir module central

3.1.7. Intervention Nutritionnelle

Quand il y a un problème nutritionnel grave dans une communauté nous essaierons d'intervenir. Pour intervenir nous avons besoin de beaucoup d'éléments, par exemple d'intervenants, de logistique et de ressources. Une fois que les éléments nécessaires à l'intervention auront été rassemblés, nous choisirons les méthodes les plus appropriées et mettrons au point des stratégies pour le prtc(i)6(s) un2inte2(s)4(n)14(ent)2(i)6(o)10(n)n0 Tc 0 Tw 38.72 0 T57( )Tj EMC

Encourager les patientes à planifier soigneusement les repas pour que soient inclus tous les nutriments nécessaires pendant la grossesse sans excès calorique. Il est utile d'utiliser un guide des aliments pour la grossesse. Décourager fermement la consommation d'alcool par la femme enceinte.

Limiter les apports en caféine.

Expliquer à la patiente de ne prendre que les vitamines et minéraux prescrits, des quantités excessives peuvent être nocives.

Expliquer aux patientes qu'il est néfaste de sauter un repas, surtout pour la femme enceinte. Le fœtus a besoin d'un apport régulier de nutriments.

Encourager la consommation d'aliments riches en fibres et l'absorption d'une grande quantité de liquides pour éviter la constipation.

Aider en priorité les adolescentes enceintes à améliorer leurs habitudes alimentaires. Planifier avec les adolescentes des repas et des en-cas qui soient nutritifs et en même temps acceptés par ces adolescentes.

Profiter de la grande motivation des patientes pendant la grossesse pour donner une éducation nutritionnelle à la famille aussi bien qu'à la femme enceinte.

Tableau 5.

Aliments riches en calcium	Lait

L’aliment vecteur doit être accepté culturellement

Le nutriment de fortification ne doit pas altérer la couleur, le goût, la durée de vie ni le coût de l’aliment vecteur

Il doit y avoir une loi qui impose la mise en application de la consommation du produit fortifié

Il doit y avoir un mécanisme de contrôle de la qualité certifiant la qualité du contenu nutritionnel du produit fortifié.

3.10. Etude de cas (activité pédagogique)

Une femme de 30 ans se présente au centre de soins, se plaignant de fatigue, œdème des extrémités inférieures, et quelquefois du visage. Elle a quatre enfants et son mari ne vit pas avec elle. Elle est travailleur journalier et c’est elle qui assure la responsabilité de ses enfants. Leur régime alimentaire journalier consiste surtout en céréales.

1. D’après les informations ci-dessus, quel est votre diagnostic?
2. Quelles sont les causes possibles du motif de consultation?
3. Quel travail diagnostique convient-il de faire?
4. Décrivez votre traitement

Traitement des mères malnutries :

Les efforts faits pour accroitre la quantité de nourriture disponible pour les femmes enceintes et celles qui allaitent peuvent être la façon la plus efficace d’améliorer leur santé et celle de leurs enfants.

Pour soutenir la lactation et maintenir

f

Gélule de vitamine A après l'accouchement.

3.2 Module Satellite sur la nutrition maternelle pour les élèves infirmier(e)s

3.2.1. Introduction

La nutrition joue un rôle important dans le maintien de la santé, la prévention des maladies, la promotion d'une croissance et d'un développement normaux et les besoins de l'activité quotidienne. C'est la raison pour laquelle chacun doit recevoir une alimentation suffisante, tout particulièrement les femmes en âge de procréer.

Le statut nutritionnel de la mère est important pour son propre bien-être aussi bien que pour celui de son enfant.

1. **But et utilisation du module**

   Ce module satellite est conçu pour des élèves infirmier(e)s afin de leur donner les connaissances et la pratique requis pour l'identification et la prise en charge des problèmes nutritionnels maternels par le processus de soins infirmiers afin de donner les soins infirmiers qui conviennent.

2. **Comment utiliser ce module satellite**

Pour une bonne compréhension du module, il est conseillé aux étudiants de suivre les consignes suivantes :

Après avoir étudié le module central, étudiez le module satellite

Répondez aux questions du test préliminaire et du test d'évaluation

Faites les activités pédagogiques, études de cas et raisonnement critique

3.2.2. Objectifs pédagogiques

Après avoir lu ce module vous devez pouvoir :

Parler des principaux problèmes de malnutrition maternelle qui constituent des problèmes de santé publique en Ethiopie

Développer des compétences concernant l'évaluation et la prise en charge des problèmes nutritionnels maternels

Prendre en charge les problèmes nutritionnels cliniques au cours de la grossesse et de l'allaitement

Utiliser le processus de soins infirmiers pour identifier les problèmes nutritionnels maternels et agir contre eux.

3.2.3Activités pédagogiques

Etude de cas et exercice de raisonnement critique

Etude de cas

W/ro Zebider a 30 ans, gravidité 11, parité 10, 7 enfants. Elle est la femme d'un fermier et marche pieds nus. Pendant sa grossesse actuelle elle a des envies irrépressibles d'argile. Elle n'a jamais bénéficié de soins prénataux pendant ses grossesses précédentes, mais, à cause de son problème actuel, elle est venue en consultation prénatale au 3ème, 7ème

Identifiez les problèmes de cette mère

Faites une liste des causes sous-jacentes de ces problèmes

Comment prenez-vous en charge ses problèmes en tant qu'infirmièr(e) ?

Que devez-vous inclure dans les conseils donnés à la mère ?

Test préliminaire

1. Quelles sont les doses de supplémentation en fer/acide folique recommandées chez les femmes enceintes pour la prévention de l'anémie?
   a. Fer 200mg/jour et acide folique 200mg/jour
   b. Fer 40mg/ jour et acide folique 300mg/ jour
   c. Fer 60mg/ jour et acide folique 400mg/ jour

   i.83 0 0 T.79 T

b. Iode d. Zinc

3.2.4. Principaux problèmes nutritionnels maternels qui constituent un problème de santé publique en Ethiopie

Voir le module central

3.2.5. Facteurs qui affectent le statut nutritionnel maternel

Voir le module central

3.2.6. Evaluation du statut nutritionnel maternel

Voir le module central

3.2.7. Intervention visant à résoudre les problèmes nutritionnels maternels

Voir le module central

3.2.8. Prise en charge des problèmes nutritionnels maternels

1. ***La prise en charge de la malnutrition protéino-calorique doit :***

   Obtenir une rapide régénération des tissus et mettre en route un traitement de la malnutrition

   Traiter les complications et réduire la létalité

   Restaurer un régime alimentaire équilibré

   Prévenir les rechutes et une dégradation future, grâce à l'éducation

   Assurer un suivi à long terme afin d'aider les membres de la famille ainsi que la

b) Traitement de l'anémie sévère chez la femme

1. Définition de l'anémie sévère

   Hémoglobine <7gm/dl or hématocrite <20%

   Associé à une pâleur extrême de la conjonctive, de la muqueuse orale, des paumes, du lit de l'ongle ou d'un essoufflement au repos

2. Décider s'il convient de traiter ou de diriger les cas qui correspondent aux critères d'anémie sévère vers l'hôpital dans les situations suivantes

   Age gestationnel >36 semaines

   Femmes qui présentent des signes de détresse respiratoire ou d'anomalie cardiaque (difficultés respiratoires et œdème)

   Si l'état de la femme ne montre pas de signes d'amélioration au suivi.

c) Les cas qui ne sont pas dirigés vers un spécialiste doivent être traités de la façon suivante :

   120mg de fer + 800mg d'acide folique par jour pendant 3 mois, en une prise unique ou en prises fractionnées ?

d) Suivi des cas traités pour anémie

   Une semaine puis quatre semaines après le début de la supplémentation en fer

e) Intervention de soins infirmiers en cas d'anémie ferriprive :

Donnez les conseils suivants à la patiente :

Le foie et les viandes rouges sont les meilleures sources de fer

L'absorption du fer provenant d'aliments de source végétale peut être améliorée si on les consomme davec1.72 b me0m /C2_1 1 Tf -18.74 -1.8 Td <one am0.003 T1 ( )TCo dne sont

1.3. Types de traitement anthelminthique après le premier trimestre :

a) Albendazole 400mg en dose unique
b) Mébendazole 500mg en dose unique
c) Levamisole 2,5mg/kg en dose unique, le mieux étant d'administrer la deuxième et la troisième dose les 2 jours consécutifs suivants
d) Pyrantel 10mg/kg en dose unique, le mieux étant de répéter la dose les 2 jours consécutifs suivants

2. Paludisme

Dans les régions end2 Tw 7.0.6ID 23 >>BDC 16.6anio(on(ég)10(i)6(ons)4(r)7Tds)420 40

3.2.9. Prise en charge des problèmes nutritionnels au cours de la grossesse

1. Grossesse des adolescentes

Evaluer le statut nutritionnel, la maturité physique et émotionnelle, les habitudes alimentaires, le niveau d'éducation

Donner des conseils nutritionnels continus

Donner une supplémentation en calories, protéines et calcium pour satisfaire les besoins de croissance et fournir en même temps davantage de calories et de nutriments pour le développement du fœtus.

2. Nausées et vomissements

Rassurer par rapport aux symptômes

Prendre des repas légers et fréquents comprenant des aliments secs riches en féculents et éviter les aliments épicés.

Vitamine B6 25mg trois fois par jour

Dans les cas sévères (Hyperemesis Gravidarum)

- Hospitalisation
- Réhydratation
- Glucose
- Antiémétiques
- Suivi

Conseils psychologiques

Eviter d'ingérer des liquides au cours des repas

Eviter le café, le thé et les aliments épicés

Eviter les aliments riches en graisses car ils retardent le temps nécessaire pour vider l'estomac.

6. Prise en charge des soins infirmiers

Le Processus Infirmier

C'est une méthode de soins systématique, centrée sur le ou la patient(e), avec des objectifs à atteindre, qui fournit un cadre à la pratique de soins infirmiers. Les infirmier(e)s doivent toujours utiliser le processus infirmier pour identifier et résoudre les problèmes d'un(e) patient(e).

1. Evaluation

a. Données subjectives

Evaluer les apports sur 24 heures selon le guide journalier des aliments

Effets secondaires de la grossesse sur le tube digestif

Changements alimentaires effectués à cause de la grossesse ou des complications liées au régime alimentaire

Fréquence des repas, évaluer les périodes de jeûne

Influences culturelles, familiales, religieuses et ethniques sur les habitudes alimentaires

Utilisation de suppléments vitaminiques et/ou minéraux

Connaissances en nutrition de la patiente et sa capacité et/ou sa volonté à mettre en pratique des changements alimentaires

Connaissances de la patiente et intentions en ce qui concerne l'allaitement maternel

Emploi par la patiente d'alcool, de tabac, de caféine, de drogues, et d'édulcorants artificiels

Statut économique

b. Données objectives

Taille

Poids avant la grossesse

Poids actuel

Calcul de l'IMC

Tension artérielle

Hémoglobine and hématocrite

2. Diagnostic infirmier

Comportement qui montre peu d'intérêt pour la santé, mis en évidence par un manque de connaissances sur ce qu'est un régime satisfaisant avant la grossesse, pendant la grossesse et pendant l'allaitement et désir d'apprendre

Altération de la nutrition. Inférieure aux besoins corporels à cause d'une biodisponibilité insuffisante

Altération de la muqueuse orale

3. Planification

Après l'identification du diagnostic et des facteurs associés, planifier les objectifs et les interventions pour la patiente.

***Objectifs de la** patiente*

La patiente :

Expliquera l'importance du régime alimentaire pour sa propre santé et pour la croissance et le développement du fœtus

Planifiera des menus journaliers satisfaisants sur le plan nutritionnel en utilisant le guide des aliments journaliers pour la grossesse

Adoptera un régime suffisant, varié et équilibré basé sur le guide de nourriture quotidienne pendant la grossesse.

Mangera trois repas par jour plus deux à trois en-cas nutritifs.

Prendra du poids dans les limites et à l'allure recommandées, comme cela est déterminé par les données de son évaluation

N'aura pas de problèmes liés à la nutrition ou aux complications de la grossesse

4. Intervention

Gestion du régime alimentaire

Définir une fourchette d'objectif de prise de poids mutuellement acceptable, basée sur les données poids/taille de départ de la patiente avant la grossesse

Promouvoir l'adoption d'un régime varié et d d d da

Formation de la patiente

Expliquer à la patiente et sa famille

L'importance d'une alimentation et d'une prise de poids convenables pour la santé de la mère et de l'enfant

Comment obtenir une qualité nutritive satisfaisante en utilisant le guide de nourriture quotidienne pour la grossesse

Qu'il ne faut prendre les suppléments que comme ils sont prescrits par le médecin car de fortes doses de certaines vitamines et minéraux peuvent causer des malformations fœtales

Que les envies pendant la grossesse n'ont pas toujours une base physiologique. Elles sont plutôt influencées par la culture, la géographie, les traditions sociales, la disponibilité des aliments et les expériences préalables.

Comment modifier son régime alimentaire pour soulager ou réduire les problèmes liés à la nutrition et les complications de la grossesse

6. Evaluations et suivi

L'évaluation est continue et suit la patiente dans les domaines suivants :

Prise de poids mensuelle. Une prise de poids inférieure à 2,2 kg par mois pour les femmes obèses et à 4,4 kg pour toutes les autres femmes justifie des examens complémentaires

Intolérances alimentaires, en particulier au lactose, et impact général sur l'adéquation du régime alimentaire

Adhésion et tolérance au régime. Evaluer s'il est adapté et s'il est nécessaire de donner des conseils supplémentaires.

Autres signes spécifiques de problèmes nutritionnels comme l'œdème, une dénutrition aigüe, la perte de poids à un moment quelconque de la grossesse, l'absence de prise de poids pendant un mois, une prise de poids excessive etc.r2<oiÍE=Ì. @ Ñ' u Q" 0 2

3.3. Module Satellite sur la nutrition maternelle pour les étudiants en techniques de laboratoire d'analyses de biologie médicale

3.3.1. INTRODUCTION

Objectif du module

Ce module est conçu pour aider les étudiants en technologie de laboratoire à connaitre les tâches et le rôle qui leur sont spécifiques dans le diagnostic et la prise en charge de la nutrition maternelle. Ce module est préparé en tenant compte des tâches, des rôles et des responsabilités des techniciens de laboratoire possédant une licence en sciences et des instructeurs. De plus, toutes les catégories d'agents de laboratoire peuvent trouver ce module utile.

Consignes d'utilisation du module satellite

Pour une bonne compréhension de ce module, il est conseillé aux étudiants en technologie de laboratoire de suivre les consignes suivantes :

Faites le test préliminaire

Lisez attentivement le module central

Comprenez le contenu du module satellite

Evaluez-vous en remplissant le test d'évaluation

Test préliminaire

1. Lequel des items suivants n'est pas un anticoagulant?
   a. Acide éthylènediamine tetra acétique (EDTA)
   b. Citrate trisodique
   c. Oxalates doubles
   d. Héparine
   e. Aucune des réponses ci-dessus

2. Identifiez la réponse fausse
   a. La carence en folates se caractérise par une anémie mégaloblastique macrocytique
   b. Le diagnostic de laboratoire de carence en vitamine A est fait par la mesure de rétinal sérique et de RBP

c. Les protéines sont des composés chimiques qui ont un poids moléculaire élevé

3.3.2. Objectifs pédagogiques

Après avoir étudié ce module, les étudiants seront capables de :

Décrire comment collecter, manipuler et étiqueter les spécimens sanguins.

Décrire le concept de diagnostic de laboratoire associé à la nutrition maternelle.

Faire la liste des tests biochimiques utilisés dans le diagnostic de l'anémie.

Décrire et mettre en évidence la morphologie des globules rouges.

Classer l'anémie selon la morphologie des globules rouges.

Décrire le concept de diagnostic de laboratoire d'une carence en micronutriments liée à la nutrition maternelle.

Décrire l'analyse microbiologique de la nourriture et de l'eau

3.3.3. Activités pédagogiques : études de cas

Cas-

Recueil du sang

Le recueil convenable et le traitement fiable des spécimens sanguins est une partie vitale du processus de diagnostic de laboratoire.

Le sang est utilisé :

Pour évaluer la morphologie des globules rouges

Pour mesurer la teneur en hémoglobine

Pour mesurer l'hématocrite

Pour évaluer la concentration en protéines, glucose et micronutriments

Pour rechercher les parasites du sang

Le sang peut être prélevé à partir d'échantillons sanguins capillaires ou périphériques, de micro échantillons et par voie veineuse.

Détermination de l'hémoglobine

L'hémoglobine est une chromoprotéine globulaire q Td [(ou)a1d [(r).851 éonsw (.)Tes,o.

Détermination de l'hématocrite PVC ou Hct

Le PCV, appelé aussi communément hématocrite, est une mesure du rapport entre le volume qu'occupent les globules rouges et le volume de sang total dans un prélèvement sanguin capillaire ou veineux. Le rapport est mesuré après une centrifugation appropriée et est exprimé sous forme de fraction décimale ou de pourcentage

Il existe deux méthodes, micro hématocrite et macro hématocrite. Bien que la méthode macro hématocrite soit recommandée par le Conseil International de standardisation en hématologie (ICSH) comme méthode alternative, elle n'est plus utilisée de façon courante à cause de problèmes techniques.

Détermination des micronutriments

A. Folates

La carence en folates est en général détectée par des anomalies hématologiques.

Une carence en folates est caractérisée par une anémie mégaloblastique macrocytaire et souvent par des signes plus légers tels que des neutrophiles hyper-segmentés.

Une mesure des niveaux de folates sériques permet également de poser le diagnostic

B. Iode

Le diagnostic de carence en iode est basé sur les tests sanguins

On observe de faibles niveaux d'iode et d'hormones thyroïdiennes ou un niveau élevé de TSH

T_4 et T_3 sur des spots de sang séché exposés à l'environnement naturel sont moins stables et ne sont utilisables que quelques jours.

La technique de recueil de spots de sang séché est à présent appliquée à des conditions de recueil standard

Un développement rapide de la technologie permettant de mesurer T_4, T_3 et la TSH par dosage immunologique permet une sensibilité et une précision accrues, une plus grande facilité et une réduction des coûts.

La mesure de l’excrétion d’iode urinaire fournit aussi en un test unique la meilleure détermination des apports en iode dans la population, utilisable à la fois pour l’évaluation initiale et pour le suivi.

C. Vitamine A

La ferritine sérique

Le récepteur de la transferrine et les réserves en fer de l’organisme

La morphologie des globules rouges

Détermination des protéines sériques

Les protéines sont des composés biochimiques qui ont un poids moléculaire élevé. Elles sont présentes dans le cytoplasme et la membrane cellulaire de toutes les cellules.

Dans des conditions pathologiques, à la fois les protéines sériques totales et le rapport des fractions protéiques individuelles peuvent se trouver modifiés indépendamment l’un de l’autre.

Les méthodes courantes de détermination des protéines totales présentes dans le sérum comprennent :

La méthode de Kjeldahl

La méthode de Kingsley Biuret

Méthode du Dye-binding

L’électrophorèse

Détermination du glucose sérique

Le glucose est un monosaccharide

La synthèse des acides aminés

La concentration en glucose plasmatique peut être mesurée par :

La méthode au ferricyanure alcalin

La méthode de réduction du cuivre

La méthode *o*-Toluidine

Le Glucostix

3.3.5. Mise en évidence de parasites sanguins et intestinaux.

Le paludisme est un problème majeur de santé publique et la cause de souffrances et de morts prématurées dans les pays tropicaux et subtropicaux.

Le paludisme est endémique dans 91 pays, et environ 40% de la population mondiale est à risque.

Le paludisme devient plus difficile à traiter, surtout dans les régions de multi-résistance aux médicaments.

Espèces très répandues : - Plasmodium falciparum
- Plasmodium vivax

Espèces moins répandues : - Plasmodium malaria
- Plasmodium ovale

Dans les régions de transmission stable du paludisme, une femme enceinte aura acquis une immunité partielle au paludisme.

Dans les régions de transmission instable du paludisme, les femmes enceintes n'ont pas d'immunité protectrice.

Une infection paludéenne non traitée peut entraîner une fausse-couche, un enfant mort-né, une naissance prématurée ou un faible poids à la naissance.

Le diagnostic de laboratoire des parasites paludéens inclut :

La détection et l'identification au microscope des parasites paludéens dans le frottis sanguin

La concentration des parasites dans le sang veineux par centrifugation lorsqu'ils ne

Les parasites intestina

La mise en culture des urines et antibiogramme

Tous les tests chimiques peuvent actuellement être faits en utilisant le N - multistick.

Analyse microbiologique des aliments

Les aliments que nous consommons sont rarement, voire ne sont jamais, stériles, ils sont porteurs de microorganismes.

Les microorganismes présents proviennent de la micro flore naturelle de l'élément à l'état brut, additionnée des organismes introduits au cours de la récolte, de la transformation, du stockage et de la distribution.

Dans la plupart des cas, la mi

Certaines bactéries Gram positif sont thermo-résistantes (thermoduriques) et peuvent donc être détectées dans des produits pasteurisés : produits laitiers et à base d'œufs

3. **Les Bacillus -** sont souvent retrouvés comme cause de contamination des aliments chauffés, surtout les aliments en boîte.

   Le Bacillus cerus cause l'entérite ou la gastroentérite

4. **Les Clostridium –** Sont souvent la cause de contamination des aliments chauffés, en boîte

   Le Clostridium botulinum forme une toxine mortelle dans les aliments

   Le Clostridium perfringens cause l'entérite à forte concentration

5. **Les Lactobacilli –** Il en existe deux types :

   Les bactéries homofermentatives (produisent seulement du lactate)

   Les bactéries hétérofermentatives (produisent de petites quantités de lactate ainsi que de l'éthanol, de l'acétate et du dioxyde de carbone

6. **Les Staphylococcus et Micrococcus**

   Les microcoques sont des organismes qui provoquent l'avarie des aliments. Ils sont couramment rencontrés dans les charcuteries.

   Le staphylocoque doré produit une puissante entérotoxine

7. **Streptocoque**

   Le Streptocoque pyogenes cause des angines transmises par les aliments

   Les entérocoques sont des organismes indicateurs qui produisent des amines vasoactives causant des changements subits de tension artérielle

   Les entérocoques sont relativement thermorésistants

Erwina

Klebsiella

10. Ne provoquent pas de fermentation lactique

Salmonella

Shigella

Proteus

Morganella

11. Virus identifiés comme contaminants des aliments

Epstein-Barr (EBV)

Virus de l'Hépatite A

Rota virus

Revue systématique des précautions analytiques essentielles pour l'obtention de résultats fiables et reproductibles dans l'examen microbiologique d'échantillons alimentaires.

1. Prélèvement
2. Manipulation avant examen
3. Préparation pour l'examen
4. Préparation d'aliquots
5. Préparation

Un seul examen de laboratoire d'un échantillon d'eau ne justifie pas la conclusion que tout va bien et que la réserve d'eau est propre à la consommation.

Tableau: 8 – Traitement de l'eau

	Nombre de bouteilles	ml de milieu de culture	Concentration du milieu
Echantillons d'eau traités	1	50	Double
	5	10	Double
Echantillons d'eau non traités	1	50	Double
	5	10	Double
	1	5	Simple

Note : Une concentration double correspond à un milieu obtenu en utilisant deux fois la quantité normale de soluté

Chaque bouteille de milieu doit contenir un tube de Durham inversé pour le recueil du gaz formé

Consulter le manuel de laboratoire médical pour pays tropicaux pour avoir une estimation du nombre le plus probable de bactéries coliformes fécales.

Test d'évaluation

Voir test préliminaire

3.4. Module Satellite sur la nutrition maternelle pour les étudiants responsables de l'hygiène de l'environnement

3.4.1. Introduction

La prévention de la malnutrition maternelle consiste en pratiques et interventions alimentaires visant la réduction du risque de maladies et/ou une amélioration des résultats sanitaires. C'est une composante critique de médecine préventive qui cherche à prévenir les maladies plutôt qu'à traiter la maladie une fois qu'elle se manifeste de façon clinique. On peut donner comme exemples de prévention de la malnutrition maternelle l'inclusion de fer dans les aliments pour la prévention de l'anémie chez la femme enceinte et l'inclusion d'un complexe de vitamines B, vitamine A, sel iodé et calcium dans les aliments de base comme les produits céréaliers, le lait et les céréales, pour la prévention des carences essentielles liées à la nutrition. Ces stratégies de nutrition maternelle ont été mises en route comme mesures de politique de santé publique depuis plus d'une génération et leur grande efficacité a été démontrée, surtout dans les pays développés.

But et utilisation du module satellite

Le but de ce module satellite est d'aider les responsables de l'hygiène de l'environnement à s'impliquer dans la prévention de la malnutrition maternelle avec les autres membres de l'équipe.

Comment utiliser ce module

Pour une bonne compréhension du module, il est conseillé aux étudiants de suivre les consignes suivantes :

Faites tout d'abord le test préliminaire puis lisez le module central. Ensuite, faites le test d'évaluation et assurez-vous d'avoir bien compris le module central.

Faites le test préliminaire du module satellite puis étudiez complètement le module satellite et faites l'activité pédagogique.

Enfin, évaluez-vous en faisant le test d'évaluation

Etude de cas

W/ro Wubalech Damtew est née et a grandi dans le District de Belesa de la zone Gondar Nord. Elle a 31 ans et se présente au centre de santé d'Arbaya en se plaignant de vertiges, de fatigue et de céphalée. Ses antécédents incluent de nombreux accouchements, un régime alimentaire pauvre et elle marche en général pieds nus. Il n'y a pas de latrines dans le village. L'agent de santé du centre de soins, soupçonnant une anémie, a demandé un examen de sang et de selles. Ses antécédents, l'examen clinique et les résultats de laboratoire confirment que son problème principal est une anémie.

Répondez aux questions suivantes en vous référant à l'étude de cas ci-dessus

1. Quelles sont les causes probables d'anémie chez cette patiente ?
2. Quelles mesures devez-vous prendre pour éviter l'anémie ?
3. Quel serait le rôle du responsable de l'hygiène de l'environnement pour réduire le problème de la communauté où vit cette femme enceinte ?

3. 4. 2. Objectifs pédagogiques

Après avoir étudié ce module, le responsable de l'hygiène de l'environnement doit pouvoir :

Identifier les causes de malnutrition maternelle

Décrire les différents facteurs de risque associés à la nutrition maternelle.

Mettre en œuvre des méthodes respectueuses de l'environnement pour résoudre les problèmes de nutrition maternelle en utilisant les différentes stratégies d'intervention.

Participer activement à la prévention de la nutrition maternelle.

3.4.3. Test préliminaire pour le module satellite d'hygiène de l'environnement

1. Lequel de ces empoisonnements alimentaires microbiens présente les signes et symptômes suivants : fatigue, étourdissements, vision double et paralysie musculaire et cause la mort en peu de temps ?
   a. Staphylococcus aureus (Staphylocoque doré))
   b. Clostridium botulinum
   c. Salmonella

d. Toxines environnementales.

2. Quel(s) élément(s) est/sont une/des toxine(s) alimentaire(s) ?
   a. Zinc
   b. Cuivre
   c. Plomb
   d. Toutes les réponses ci-dessus
3. D'après les standards de l'OMS, la culture de fruits et légumes comestibles utilisant des eaux usées est possible si et seulement si les mesures de coliformes et d'Escherichia coli sont de :
   a. 10 000 coliformes/10ml et 100 Escherichia coli /100ml d'eaux usées
   b. 50 000 coliformes /1ml et 500 Escherichia coli /100ml d'eaux usées
   c. 1 000 -100 000 coliformes /100ml et 100 Escherichia coli /100ml d'eaux usées
   d. 100 000 coliformes / ml et 500 Escherichia coli /100ml d'eaux usées
4. Les inspecteurs sanitaires ont un rôle primordial dans la prévention de la malnutrition maternelle. Enumérez quelques-unes des mesures pratiques de prévention de la malnutrition maternelle.
5. Expliquez clairement les différentes questions préliminaires à envisager lors de la transformation des aliments, de la culture à la consommation.

Importance et description rapide de la prévention de la malnutrition maternelle

La malnutrition maternelle est critique pour la santé de la mère. Tous les nutriments essentiels doivent être traités et acheminés en suivant les règles d'hygiène.

Dans les pays développés, des avancées significatives ont été faites dans le domaine de la sécurité des aliments. Des pratiques et des systèmes de surveillance déficients persistent dans les pays en voie de développement comme l'Ethiopie. La priorité dans notre pays doit porter sur des actions concertées en accord avec les connaissances scientifiques et le développement des technologies actuels. Les autres objectifs doivent porter sur la promotion de la législation et sur l'éducation des populations concernant l'importance de la sécurité alimentaire. La persistance de pratiques dangereuses et malsaines qui compromettent sévèrement la qualité sanitaire des aliments doit être évitée.

Exemples de mauvaise qualité sanitaire des aliments :

Pratiques de contrefaçons du lait, addition de différentes substances inertes dans les aliments et les épices.

Ajout d'additifs inconnus.

Transformation d'aliments dans des structures non autorisées.

Culture de légumes utilisant des eaux polluées pour l'irrigation.

Les végétaux propres à la consommation doivent être cultivés en utilisant des eaux usées qui contiennent moins de 100,000 de coliformes /100ml et un nombre d'Escherichia coli <100 / 100ml.

Pour déterminer les niveaux de contamination de l'eau, pratiquer :

a) Analyse physique (organoleptique)

Goût

Couleur

Odeur

b) Analyse bactériologique de l'eau

- Test multitubes pour vérifier la production de gaz et le changement de couleur
- Technique de filtration sur membrane
- Numération des colonies et culture plus approfondie des colonies à 44° C pour mettre en évidence Escherichia coli.

c) Analyse chimique de l'eau

- Pour s'assurer de sa qualité chimique, en particulier pour le fer, les fluorures etc en utilisant les équipements de laboratoire disponibles.

Transport fréquent de denrées périssables exposées à des contaminants chimiques et biologiques à l'air libre et sans réfrigération.

La gastroentérite causée par des agents viraux ou bactériens, la typhoïde, l'hépatite, le choléra et les maladies parasitaires sont couramment contractés dans des établissements insalubres.

Pour une nutrition maternelle convenable, les aliments doivent être traités de façon sécurisée de la production à la préparation, le stockage, le transport et les services. Les aliments doivent être exempts de tout produit chimique capable de causer un problème aigu ou chronique à la mère.

Pendant la culture

Pendant la pousse

Pendant le stockage

Pendant le transport

une infection parasitaire. Donc, pour prévenir ces problèmes, les interventions majeures suivantes doivent être menées par le responsable de l'hygiène de l'environnement en partenariat avec l'équipe du centre sanitaire et la communauté.

A. Prévention de l'anémie

a) **Ankylostome** – Dans les communautés où l'ankylostome est endémique,

- Construction de latrines et éducation de la population à leur utilisation
- Port de chaussures
- Anthelminthique / déparasitage / médicaments donnés à toutes les personnes anémiques pour éliminer les vers intestinaux

b) **Pa6(envDud)-3(o)-5(tm)8e**

B*. Prévention de la malnutrition protéino-calorique*

Education à la nutrition concernant :

Mauvaises pratiques traditionnelles et croyances sur l'alimentation des femmes enceintes et qui allaitent.

Distribution de la nourriture au sein de la famille

Hygiène personnelle de la personne qui prépare la nourriture, propreté des ustensiles et de tout le cadre de vie.

Culture de légumes à feuilles vertes qui contiennent du fer.

Voir le module central)

C. Prévention de la carence en iode

Apprendre aux populations à consommer du sel iodé avec leurs aliments

Faire l'analyse chimique de l'eau pour vérifier la concentration en iode afin de prendre toute mesure préventive possible.

Dans les régions où la formation des sols est rocheuse et éloignée de la mer, les gens doivent être sensibilisés au fait qu'ils ont besoin de consommer du sel iodé.

D. Prévention de la carence en vitamine A

La carence en vitamine A peut affecter l'œil et conduire à la cécité, donc le responsable de l'hTD [(ont)2( )Tj 97d [ceTj 0.004 npTD [(ont)Leceome01d2.8 0 Td 52(é,)2568 Td

3.4. 5. Test d’évaluation

2. La carence en lequel de ces micronutriments cause-t-elle la cécité nocturne ?
   a)

1. Quels problèmes de santé majeurs pouvez-vous identifier chez cette patiente ?
2. Quelle conclusion tirez-vous de la pâleur de ses paumes et de la conjonctive ? Comment pouvez-vous aider à prévenir de tels problèmes en tant qu'étudiant(e) du Programme d'Extension Sanitaire ?
3. Nommez deux parasites intestinaux importants qui peuvent être évités par le port de chaussures.

3.5.7. Causes de malnutrition maternelle

Manque de connaissances

Infection

Mauvaises pratiques culturelles

Pauvreté

Catastrophes naturelles ou d'origine humaine

Troubles sociaux (guerre)

Production de nourriture insuffisante

Croissance de la population non maîtrisée

Commercialisation, stockage et distribution déficients

3.5.8. Facteurs affectant la nutrition maternelle

1. Culture et croyances

Pendant les périodes de jeûne, des nutriments essentiels ne sont pas consommés, par exemple les produits d'origine animale.

Discrimination dans la distribution de nourriture parmi les membres de la famille, d'abord les hommes adultes, puis les femmes, enfin les enfants nourris avec les restes.

2. Grossesse et allaitement

Le régime alimentaire de la femme enceinte doit comprendre des apports accrus de façon substantielle en calories, protéines, calcium, acide folique et fer.

Les femmes enceintes qui courent un risque particulier de carences nutritionnelles sont les adolescentes, les femmes maigres, les femmes obèses, les femmes qui ont des problèmes nutritionnels chroniques, celles qui fument ou qui consomment de l'alcool ou des drogues, les

femmes dont les revenus sont

Les apports en caféine doivent être restreints. Expliquez à la patiente qu'elle ne doit prendre que les vitamines et les minéraux prescrits car des quantités excessives peuvent être nocives.

Mettez en garde les patientes sur le fait que sauter un repas est néfaste, surtout pour la femme enceinte. Le fœtus a besoin d'un apport régulier de nutriments.

Encouragez la consommation d'aliments riches en fibres et l'absorption d'une grande quantité de liquides pour éviter la constipation.

deuxième trimestre par une hémoglobinémie inférieure à 10,5gm/100ml ou un hématocrite inférieur à 32%.

C'est la forme la plus fréquente de malnutrition

C'est la forme la plus fréquente d'anémie

Les autres causes d'anémie sont les infections parasitaires et le paludisme

Causes de carence en fer alimentaire

- Faibles apports en fer dans l'alimentation
- Faible biodisponibilité du fer

Infections parasitaires telles que l'ankylostome

- Causent des pertes de sang
- Augmentent les pertes de fer

Paludisme

- Détruit les globules rouges
- Entraîne une anémie sévère
- Augmente les risques pendant la grossesse

Conséquences de l'anémie maternelle

- Mort de la mère
- Réduction du transfert de fer au fœtus
- Faible poids de naissance
- Mortalité néonatale
- Réduction de l'activité et de la productivité physiques
- Troubles de la cognition

5.3. Carence en vitamine A

Causes

- Apports insuffisants
- Infections récurrentes
- Cycle de la reproduction

Conséquences

- Cécité nocturne

Mortalité maternelle

Fausse-couche

Enfant mort-né

Faible poids de naissance

Réduction du transfert de vitamine A au fœtus

Transmission verticale du VIH

Faible concentration en vitamine A dans le lait maternel

5.4. Carence en iode

Les causes incluent :

Le fait de vivre dans une région montagneuse où les aliments provenant de végétaux ne contiennent pas une quantité suffisante d'iode

Le fait d'ingérer les tubercules de manioc comme un aliment sans les détoxifier et toute autre exposition à des agents chélateurs.

Le fait de ne pas consommer (ou de "ne pas avoir accès à") des produits de la mer

Les conséquences incluent :

L'affaiblissement des facultés cognitives

De mauvaises performances scolaires

Un crétinisme endémique

3.5.12. Evaluation du statut nutritionnel maternel

Les indices avec exposant expriment soit le poids par rapport à une fonction avec exposant de la taille soit la taille par rapport à une fonction avec exposant du poids.

Evaluation de la malnutrition protéino-calorique chez les femmes

Taille inférieure à 1,45m

Poids inférieur à 45kg

IMC inférieur à 18,5 (maigreur)

Prise de poids pendant la grossesse inférieure à 1,5kg/mois au cours des deuxième et troisième trimestres (ou moins de 10,5kg pris pendant la durée de la grossesse)

Indice de Masse Corporelle = Poids/$(\text{Taille})^2$

Tableau : 5. IMC et prise de poids recommandée au cours de la grossesse

IMC avant la grossesse	*Prise de poids totale recommandée (kg)*
Bas (IMC < 19,8)	12,5 – 18
Normal (IMC 19,8 – 26)	11,5 – 16
Elevé (IMC > 26 - 29)	7 – 11,5
Obèse (IMC >29)	< 7

Indicateurs courants

Œdème

Dépigmentation des cheveux

Commissures des lèvres fendillées (stomatite)

Lésions de la cornée

Gonflement (hypertrophie) des glandes

Xérosis, etc.

Interventions clés pour l'amélioration de la Nutrition Maternelle

Amélioration de la nutrition maternelle

Garantir l'accès au sel fortifié en iode et sa consommation dans chaque ménage

Distribuer une forte dose de vitamine A dans les six semaines qui suivent l'accouchement

Distribuer des suppléments de fer pendant les six derniers mois de grossesse

Retarder la première grossesse

Accroitre l'intervalle entre deux naissances

Augmenter la quantité d'aliments pendant la grossesse et l'allaitement

Donner accès aux appareils qui facilitent le travail

3.5.13. Approche « Actions Nutritionnelles Essentielles » (ANE) :

Approche basée sur des actions nutritionnelles

Avec l'approche « actions nutritionnelles essentielles » (ANE), la baisse attendue de mortalité infantile est de 5%.

Domaines d’action :

1. Nutrition de la femme :

Messages clés :

Pendant la grossesse et l’allaitement

Augmentation des apports caloriques

Supplémentations en fer et acide folique

Traitement et prévention du paludisme

Lutte contre les parasites pendant la grossesse

Gélule de vitamine A après l’accouchement

2. Lutte contre la carence en vitamine A :

Messages clés :

Aliments riches en vitamine A

Supplémentation maternelle

Fortification des aliments

Vitamine A

Groupe cible	Posologie UI	Fréquence
Femmes en post partum	200, 000	dans les 45 jours après l’accouchement

3. Lutte contre l’anémie :

Messages clés :

Supplémentation en fer et folates pour les femmes et les enfants.

Groupe	**Doses de fer-acide folique**	**Durée**
Femmes en âge de procréer	1 comprimé	6 mois

Si l'ankylostome est hautement endémique (prévalence > 50 %), prendre une dose supplémentaire au cours du troisième trimestre de grossesse.

Lutte contre le paludisme

Prescrire et rendre accessibles aux femmes enceintes les antipaludéens curatifs et/ou prophylactiques (selon les recommandations locales)

4. Lutte contre les maladies dues à une carence en iode :

Messages clés :

Accès au sel iodé et consommation par toutes les familles

Gélules d'iode

Posologie :

- Une gélule pour les femmes enceintes
- Deux gélules pour les femmes en âge de procréer

Iodation généralisée

Les maladies dues à une carence en iode peuvent être éliminées par une consommation quotidienne de sel iodé. Le sel est universellement utilisé par tous les groupes d'âge, tous les groupes socio-culturels et religieux d'un bout à l'autre de l'année. Le sel iodé représente une mesure à la fois préventive et curative de la carence en iode et c'est la solution à long terme d'un problème de santé majeur qui est la plus efficace et la moins chère.

Supplémentation avec des gélules d'iode

Le sel iodé doit être utilisé quotidiennement dans un environnement qui présente une carence

Régime alimentaire maternel

Allaitement maternel exclusif

Signes de risque, planning familial, prévention des maladies sexuellement transmissibles

Règles d'hygiène pendant l'accouchement

Sel iodé

2. Accouchement, accouchement sécurisé

Allaitement maternel exclusif

Vitamine A, Fer/Acide folique

Régime alimentaire, planification familiale et infections sexuellement transmissibles, recours à un spécialiste

3. Période post-natale et Planification familiale :

Allaitement maternel exclusif, Régime alimentaire, Fer/Acide folique

Planification familiale, prévention des infections sexuellement transmissibles

Vaccination de l'enfant

4. Immunisations :

Vaccinations, Vitamine A

Lutte contre les parasites

Evaluation et traitement de l'anémie du petit enfant

Planification familiale, prévention des infections sexuellement transmissibles, recours à un spécialiste

UNITE QUATRE

AUTEURS

1.

REFERENCES

1. Steven G. Gabbe Obstetrics, normal and problem pregnancy, maternal nutrition in pregnancy. Third edition 175-176 1996.

2. Greogy and Resnik Maternal and fetal medicine, maternal nutrition Third edition 162-169 1994

3. Williams obstetrics maternal nutrition 21st edition 230-244 1997

4. J.A. salvato, Environmental Engineering and Sanitation: 3rd- edition; John wholly and son inc 1992.

5. Adrianne Bendich "Preventive nutrition" The comprehensive Guide for Health professional, second Edition, Hunane press, and 2001.

6. B, Tefera, Human Nutrition for students Health sciences (lecture note) Jimma university 2002.

7. Ruth F. Craven, Ea.tal (1996) Fundamentals of Nursing (Human Health and Function), 2nd edition

8. Suzane C. Smeltzer. Ea.tal, (1995), Medical Surgical Nursing, 8th edition

9. Susan G. Dudek, Nutrition Handbook for Nursing Practice, 3rd edition

10. Module on food and Nutrition for masters in public Health modular Teaching for diploma program, Gondar university, Melkie Edrie July 20, 2004

11. The science of food. An introduction to food science, Nutrition and Microbiology, 2nd editi P.M. Gaman and K.B. Sherrington, peramon presb

12. Nutrition Essentials. A Guide for health managers WHO 1999.