Module sur la Tuberculose Pulmonaire

Pour l’équipe du centre de santé éthiopien

Université Alemaya

2004

2004

Table des matières

Liste des personnes ayant participé à l'élaboration de ce module i

Remerciements ii

Table des matières iii

Partie 1: Introduction

1.1 Objectifs et utilisation du module……1

1.2 Comment utiliser les modules ……..1

Partie 2: Module central

2.1 Test préliminaire 3

2.2 Prévalence et description de la tuberculose pulmonaire 7

2.3 Objectifs pédagogiques 8

2.4 Activité 1 8

2.5 Dé

d’analyses de biologie médicale 48

Pulmonary Tuberculosis Module

compris, lisez le module satellite correspondant à votre profession ou à ce qui retient votre intérêt.

Lisez l'analyse des tâches pour l'équipe du centre de santé et comparez-la avec celle de votre équipe.

Note: Reportez-vous au glossaire (unité 5) et aux abréviations (unité 6) à la fin du module pour le vocabulaire qui ne serait pas clair.

PARTIE 2

MODULE CENTRAL

2.1 Test préliminaire

Répondre aux questions sur papier libre.

2.1.1 Première partie: Questions du test préliminaire pour tous les membres de l'équipe du centre de santé.

Indiquer si les phrases sont vraies ou fausses pour les questions 1-7 et donner une réponse courte pour les questions 8-12.

1 La tuberculose pulmonaire n'est pas un problème majeur de santé publique en Ethiopie.

2 La tuberculose est une maladie guérissable et évitable.

3 Se couvrir la bouche pour tousser peut freiner la propagation de la tuberculose pulmonaire (TP).

4 Serrer la main d'un patient atteint de tuberculose pulmonaire peut transmettre la maladie.

5 Une infection par le VIH est un facteur de risque de développer une tuberculose pulmonaire.

6 Tous les patients souffrant d'une toux chronique de trois semaines ou plus doivent être consid

tuberculose ?

2.1.2 Deuxième partie : Questions du test préliminaire selon les professions de l’équipe du centre de santé.

2.1.2.1 Questions pour les professionnels de santé

Indiquer si les phrases sont vraies ou fausses pour les questions 1-10 et donner une réponse courte pour les questions 11-17.

1 Après une primo-infection tuberculeuse, on ne peut refaire une tuberculose maladie qu’après réinfection.

2 L'un des principaux critère diagnostic la tuberculose pulmonaire chez un enfant est qu’il ait eu un contact avec un patient adulte atteint de tuberculose pulmonaire confirmé par des prélèvements positifs.

3 Il est possible de diagnostiquer la tuberculose pulmonaire si un examen cytobactériologique des crachats (ECBC) (échantillon d'expectorations) sur trois est positif pour les bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR).

4 La plupart des enfants atteints de tuberculose pulmonaire onstae tuntd ())T0j -0.4ti3-10(e)11(s)

14 Quels médicaments sont utilisés dans la phase intensive de chimiothérapie de courte durée contre la tuberculose pour un cas de TP à prélèvements positifs nouvellement diagnostiqué ?

15 Que donner à un enfant de trois ans qui a été en contact rapproché avec un patient atteint de TP à prélèvements positifs si l'enfant ne montre aucun signe ou symptôme de TP ?

16 Quels sont les principaux effets secondaires de l'INH et de la rifampicine ?

17 Quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie DOTS (pharmacothérapie à surveillance directe de courte durée) ?

2.1.2.2 Questions pour les infirmières de santé publique

Indiquer si les phrases sont vraies ou fausses pour les questions 1-3 et donner une réponse courte pour les questions 4 et 5.

1 L'IDR (intradermoréaction) à la tuberculine est un test diagnostique spécifique à la détection de la TP.

2 Le BCG peut guérir la TP.

3 Le vaccin du BCG ne peut pas prévenir les cas graves de tuberculose.

4 Quels sont les médicaments essentiels contre la tuberculose ?

5 Que doivent faire les infirmiers si un patient développe des effets secondaires mineurs et majeurs aux médicaments contre la tuberculose ?

2.1.2.3 Questions pour les agents d'hygiène communautaire (Inspecteurs en santé publique)

Choisir la meilleure réponse pour les questions 1-4 et donner une réponse courte pour les questions 5-8.

1 Quelle est la méthode la plus efficace pour contrôler la transmission de la TP par un cas source ?

a) Laisser la lumière du soleil entrer dans les lieux de vie ou de travail.

b) Cracher dans des boîtes puis en brûler le contenu.

c) Se couvrir la bouche pour tousser et/ou éternuer.

d) Traitement préventif.

2 Quel est la surface habitable (espace de sommeil) idéale recommandée par adulte pour éviter le surpeuplement ?

a) $0,1m^2$

b) $0,5m^2$-$1m^2$

c) $2m^2$- $3m^2$

d) Aucune de ces réponses.

3. Laquelle de ces méthodes permet de tuer directement les bacilles responsables de la tuberculose ?

a) L'utilisation de ventilation aspirante.

b) L'irradiation par UV.

c) L'utilisation de masques respiratoires.

d) Aucune de ces réponses.

4. Identifier la méthode la moins efficace pour se protéger de l'exposition à la TP.

a) Une bonne ventilation des espaces de travail et de vie.

b) Le traitement des cas actifs de TP.

c) Le port de masques respiratoires pour prévenir l'inhalation de gouttelettes infectieuses.

d) Laisser la lumière du soleil entrer dans les lieux de vie ou de travail.

e)

3 Chaque cas probable de TP doit donner lieu au prélèvement et à l'analyse de deux échantillons d’expectorations.

4 Le BAAR peut être observé au microscope lorsque l'on utilise de l'huile à immersion.

5 Pour le diagnostic de la TP, l’échantillon d’expectorations doit toujours être obtenu le matin.

6 L’examen macroscopique des expectorations ne fait pas partie des examens de routine de diagnostic de la TP.

7 Il est facile de mettre en évidence les bacilles de Koch par la coloration de Gram.

8 Le “Barakina” est un des réactifs utilisés pour la technique de concentration dans le cadre du diagnostic de TP.

9 Donner quatre méthodes utilisé

2.4.2 Questions sur l'étude de cas

Répondez aux questions suivantes en vous référant à l'étude de cas présentée ci-dessus.

1 Que pensez-vous du problème de santé de W/o Amina ?

2 Quelle est votre réaction sur les conseils donnés par les voisins ?

3 Que pensez-vous des conditions de vie de la famille d'Amina ?

4 Quelles mesures prendriez-vous pour cette famille ?

2.5 Définition

La tuberculose pulmonaire est une infection chronique des poumons causée par des bactéries.

2.6 Épidémiologie

Environ un tiers de la population mondiale est atteint de tuberculose. Chaque année, trois millions de personnes meurent de la tuberculose, surtout dans les pays en voie de développement où cette maladie tue un adulte sur cinq. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait prédit une épidémie mondiale de tuberculose : elle a tué 30 millions de personnes dans les années 1990. On s'attend à ce que le nombre de nouveaux cas de tuberculose dans le monde passe d'environ sept millions en 1990 à plus de dix millions en 2000. Près de 75% des cas de tuberculose pulmonaire dans les pays en voie de développement concernent les groupes de la population actifs économiquement. La maladie provoque des taux d'infection et de mortalité record parmi les femmes et les filles, ce qui fait de la tuberculose pulmonaire la première cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer.

En Éthiopie, selon un rapport du département du Ministère de la Santé en charge de la planification, la tuberculose était en 1995 l'une des principales causes de morbidité parmi les malades ambulatoires, se classant en quatrième position (3,7%) ; elle était la troisième cause d'admission à l'hôpital, les patients atteints de tuberculose représentant 9,4% de tous les patients admis à l'hôpital. De plus, elle était la première cause de mortalité au sein des hôpitaux, puisque les patients qui en décédaient représentaient 27% des décès à l'hôpital. Selon le rapport du Ministère de la Santé de 1992 (calendrier éthiopien, soit 1999-2000 calendrier grégorien), la tuberculose était l'une des principales causes de morbidité des malades ambulatoires, se plaçant en 8ème position (3,35%). Pour plus d'information sur les derniers chiffres régionaux concernant la mise en place de la stratégie DOTS (pharmacothérapie sous surveillance directe de courte durée), voir les annexes 1 et 2.

Le Programme National de Surveillance de la Tuberculose et de la Lèpre (PNSTL) estime que le nombre de nouveaux cas se monte à environ 90 000 chaque année, dont environ 45% sont

Figure 2.1. Un cas de TP bacillifère est la source principale d’infection de la communauté.

2.7 Etiologie et pathogenèse

La tuberculose pulmonaire est causée par un bacille appelé Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch. Elle peut parfois être causée par Mycobacterium bovis et Mycobacterium africanum, mais ces souches sont beaucoup moins fréquentes.

L'organisme est un bacille acido-alcoolo-résistant. C'est un organisme aérobie non motile et non sporulé. Sa croissance et sa multiplication sont lentes. Il ne résiste pas à la chaleur, à la pasteurisation ou aux ultra-violets, et meurt lorsqu'on le fait bouillir. Les bacilles peuvent vivre longtemps dans le noir et résistent au froid. Ils ne survivent pas longtemps quand on les expose à la lumière du jour, mais sont très résistants à la dessiccation.

Un individu sain est infecté lorsqu'il inhale des gouttelettes en suspension dans l’air contenant des BAAR, et

2.9 Diagnostic

Signes cliniques (voir ci-dessus),

Examens de laboratoire :

- Recherche de BAAR dans les expectorations : c'est le test de confirmation le plus pratique et important. La coloration de Ziehl Neelsen est utilisée pour la coloration des bacilles acido-alcoolo-résistants.
- Culture : utilisée pour évaluer la pharmacorésistance des bacilles mais pas habituellement utilisée à des fins diagnostiques en Éthiopie.

stratégie DOTS implique que le traitement soit disponible aussi près du logement du patient que possible.

Chimiothérapie de longue durée (Long course chemotherapy - LCC), qui dure 12 mois.

2.10.4 Pharmacorésistance

Il existe deux sortes de pharmacorésistance :

Résistance primaire : résistance aux antituberculeux chez une personne qui n'avait pas pris d'antituberculeux auparavant.

Résistance secondaire (acquise) : résistance aux antituberculeux chez une personne qui avait déjà pris des antituberculeux.

Les principales causes de développement d'une résistance sont :

Prescriptions non adaptées et mauvaises associations d'antituberculeux

Apport ou prise irrégulière des médicaments (thérapie antituberculeuse mal respectée), et manque de suivi et de surveillance.

Pulmonary Tuberculosis p-uD [(P)2()2(ul)nj56cn /TT0 14

2.11.4 Contrôle

Détection des cas actifs et silencieux,

Examen médical des personnes entrées en contacts avec cas confirmés de tuberculose,

Administration de chimiothérapie,

Récupération des cas d’abandon,

Désinfection,

Signaler les cas,

Surveillance et monitoring

2.11.5 Formation santé

La formation en santé publique assure l'investissement de toute la collectivité et sensibilise la population aux effets de la maladie et aux mesures à prendre pour la prévenir. L’éducation ne doit pas être limitée aux gens qui se rendent dans des centres de santé, mais elle doit être dispensée dans différents lieux, comme les écoles ou les usines, ou pendant d'importants rassemblements de la communauté, etc. Lorsque l'on informe les gens sur la tuberculose pulmonaire, il est important d'inclure les éléments suivants, en utilisant des termes simples basés sur des principes scientifiques.

Décrire l’agent causal de la tuberculose.

Expliquer le mode de transmission de la maladie.

Donner des instructions claires sur la nécessité d’un traitement régulier et sans interruption.

Expliquer l’importance du suivi.

Exposer les mesures de prévention et de contrôle.

2.12 Activité 2

Jeu de rôle (exercice de groupe)

Objectifs:

- Sensibiliser les apprenants à la maladie.
- Montrer que le jeu de rôle peut être utilisé comme méthode d'enseignement.

Instructions:

- Utilisez l'histoire suivante comme incitation à utiliser le jeu de rôle si votre apprentissage se fait en groupe.

Histoire d'un patient avec toux

Un patient fumeur qui tousse et crache régulièrement çà et là vient consulter au centre sanitaire, soutenu par un parent. Après un bref récapitulatif de sa maladie, il est examiné par un professionnel de santé qui lui demande de se soumettre à divers examens en laboratoire. Pour finir, une formation santé est prodiguée au personnel du centre de santé. Le patient et son parent y assistent également.

.

PARTIE 3

MODULES SATELLITES

3.1 MODULE SATELLITE POUR LES AGENTS DE SANTE

3.1.1 Comment utiliser ce module

Avant de lire ce module satellite assurez-vous que vous avez fini le test préliminaire et étudié le module central.

Poursuivez la lecture de ce module satellite.

3.1.2 Objectifs pédagogiques

Grâce au module, le lecteur sera capable de :

Diagnostiquer la TP chez les enfants et les adultes.

Décrire les antituberculeux, leur mode d'action, leur posologie et voie d'administration, leurs effets secondaires et contre-indications.

Traiter et faire le suivi de patients atteints de tuberculose pulmonaire.

Organiser des programmes de prévention et de lutte contre la tuberculose.

Suite de l’étude de cas :

Le professionnel de santé de service, après avoir analysé les résultats d'Amina, la place sous thérapie DOTS. Il lui conseille de suivre la phase initiale du traitement (phase intensive) en restant en ville, à proximité du centre de santé. On lui demande également de venir chercher les médicaments tous les mois au centre sanitaire pour la deuxième phase. W/o Amina insiste sur le fait qu'elle a cinq enfants à la maison et que personne ne peut s'occuper d'eux. Elle demande si la clinique qui se trouve près de son village peut lui fournir les médicaments. Mais le professionnel de santé lui répond qu'elle a été examinée au centre de santé et devrait continuer à suivre le traitement à proximité de ce centre. W/o Amina ne peut que suivre ce conseil. Elle doit parfois retourner chez elle pour voir ses enfants. Ainsi, elle omet de prendre le traitement deux à trois jours par semaine. Cependant, compte tenu des problèmes d'Amina, le centre de santé l'autorise à prendre des médicaments pour compenser les prises manquées.

Répondez aux questions suivantes en vous référant à l’étude de cas donnée ci-dessus.

1 Quel conseil donneriez-vous à Amina au sujet de ses enfants ?
2 Que pensez-vous de la thérapie conseillée à Amina au centre de santé ?
3 Pouvez-vous suggérer un autre traitement et une autre stratégie de suivi pour Amina ?
4 Que pensez-vous de l’interruption de traitement de deux ou trois jours par semaine ?
5 Serait-il possible de compenser le traitement pour les jours manqués ?
6 Comment aborderiez-vous le traitement de la TP pour des patients dans la situation d’Amina ?
7 Quelles conséquences l’interruption des médicaments pourrait-elle avoir ?

3.1.6.2 **Chez les enfants**

Seul un faible pourcentage d'enfants atteints de TP ont des prélèvements positifs pour le BAAR. Le diagnostic de la tuberculose se fait lorsque trois des points suivants sont vérifiés, ou deux dans le cas d'une malnutrition protéino-calorique.

Signes et symptômes fortement suggestifs de tuberculose.

Antécédent d'un contact proche avec un adulte atteint d'une TP à prélèvement positif.

Analyses radiologiques compatibles avec la tuberculose.

IDR positive chez les enfants non vaccinés.

3.1.7 Suivi

3.1.7.1 Éléments à prendre en compte systématiquement.

Toujours analyser trois échantillons d'expectorations chez des cas probables de tuberculose.

N'utiliser que des combinaisons de médicaments recommandées.

Convaincre le patient et sa famille de la nécessité de suivre le traitement jusqu'au bout.

Éduquer le patient au sujet de la maladie, des médicaments utilisés et de leurs effets secondaires.

S'assurer que tous les enfants de moins de six ans dont un membre de la famille a une tuberculose pulmonaire soient examinés et leur donner le traitement adapté s'ils présentent les symptômes de la tuberculose ou une chimiothérapie préventive.

Être généreux et compréhensif avec le patient.

Noter quotidiennement l'évolution de chaque patient.

3.1.7.2 A ne pas faire

Ne jamais traiter un cas probable de tuberculose sans avoir recueilli et examiné d'expectorations.

xEffets secondaires :

Les effets secondaires fréquents et rares des antituberculeux sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3.1.2: Effets secondaires des antituberculeux.

Médicament	Effets secondaires fréquents	Effets secondaires rares
Rifampicine	Ictère, anorexie, vomissements, douleur abdominale	Prurit avec ou sans éruption cutanée, anurie, Thrombopénie
Isoniazide	Ictère, névrite périphérique	Fièvre, éruption cutanée, convulsions, psychoses.

3.1.7.4 Schéma de prise en charge des cas



Fig: 3.1.1. Schéma de prise en charge des cas de tuberculose pulmonaire.

3.1.7.7 Régimes thérapeutiques

Il existe trois régimes thérapeutiques spécifiques à des groupes définis.

Stratégie DOTS (Pharmacothérapie sous surveillance directe de courte durée):

La stratégie DOTS est indiquée pour les cas suivants:

- Nouveau cas de TP à prélèvement positif,
- Nouveaux cas de TP à prélèvement négatifs qui sont gravement malades,
- Rechute, échec thérapeutique ou traitement après interruption (dans tous les cas, seulement lorsque les patient

Schéma de seconde intention

Un traitement de seconde intention est indiqué pour les cas suivants :

- Rechute après une stratégie DOTS,
- Échec thérapeutique après une stratégie DOTS,
- Patients de retour après une interruption et qui sont atteints de TP à prélèvement positif après une stratégie DOTS.

Il est important de freiner l'émergence de pharmacorésistances multiples.

Dans le schéma de seconde intention, cinq médicaments sont donnés pendant les deux premiers mois, quatre pendant le troisième mois de la phase intensive et trois médicaments sont donnés durant la phase d'entretien pendant cinq mois. Se reporter à l'annexe III pour une description plus détaillée.

3.1.7.8 Suivi

Lors du suivi d'un patient atteint de tuberculose pulmonaire, respecter le protocole suivant.

Évaluat ence

même traitement. Si le résultat est négatif cinq mois ou plus après le début de la chimiothérapie, le patient est déclaré en échec thérapeutique et doit commencer une seconde thérapie complète en suivant le schéma de seconde intention.

Vous avez maintenant terminé le module central et le module satellite, mais il reste des activités indiquées ci-dessous.

1. **Lisez l'analyse des tâches des différentes catégories de l'équipe du centre de santé à l'unité 4.**
2. **Faites les questions du test préliminaire comme un test d'évaluation.**

   N.B: Répondez sur une autre feuille.
3. **Comparez vos réponses aux tests préliminaire et d'évaluation grâce au corrigé, annexe IV, et évaluez vos progrès.**

3.2 Module satellite pour les infirmières de santé publique

3.2.1 Comment utiliser ce module

Avant de lire ce module satellite assurez-vous que vous avez répondu à toutes les questions du test préliminaire et étudié le module central.

Poursuivez la lecture de ce module satellite.

3.2.2

Antituberculeux utilisés en Éthiopie

Les principaux antituberculeux utilisés en Éthiopie et leur mode d'action sont indiqués dans le tableau 3.2.1 ci-dessous.

Tableau

Vous avez maintenant terminé le module central et le module satellite, mais il reste des activités indiquées ci-dessous.

1. **Lire l'analyse des tâches des différentes catégories de l'équipe du centre de santé à l'unité 4.**
2. **Faites les questions du test préliminaire comme un test d'évaluation.**

   N.B: Répondez sur une autre feuille.
3. **Comparez vos réponses aux tests préliminaire et d'évaluation grâce au corrigé, annexe IV, et évaluez vos progrès.**

3.3 Module Satellite pour les Agents d'Hygiène Communautaire (inspecteurs en santé publique)

3.3.1 Comment utiliser ce module

Avant de lire ce module satellite assurez-vous que vous avez répondu à toutes les questions du test préliminaire et étudié le module central.

Poursuivez la lecture de ce module satellite.

3.3.2 Objectifs pédagogiques

Grâce au module, le lecteur sera capable de :

Décrire les méthodes de contrôle de la tuberculose pulmonaire au niveau d'un cas source.

Expliquer les mesures environnementales de lutte contre la tuberculose pulmonaire.

Connaître les principes de traitement dans le contrôle de la TP.

Participer aux programmes de vaccination.

Mener des formations de santé publique pour des individus, familles ou communautés.

3.3.3 Activité

Étude de cas : suite du module central (section 2.4)

W/o Amina Salat est très sociable avec ses voisins. Elle a l'habitude de rendre visite à beaucoup de ses voisins les plus proches pour la cérémonie du café. Elle sert généralement le café le matin et l'après-midi dans sa petite tukul bien chaude où elle le partage avec quatre à cinq personnes. Ses voisins ont constaté qu'Amina toussait souvent et lui ont conseillé de porter des vêtements chauds et de rester à l'intérieur de peur que les températures basses n'aggravent sa maladie, qu'il considère comme une maladie causée par le froid : Dhukuba Qilensa (Oiseau Beshita). Amina ne se couvre jamais la bouche lorsqu'elle tousse. Amina est aussi très aimée des petits enfants de la communauté. Les enfants de ses voisins se rassemblent le soir chez elle, et restent autour du feu avec ses propres enfants jusqu'à ce que leurs parents les appellent pour le dîner. Ces enfants sont pour la plupart amis avec les enfants d'Amina. Amina s'assoit généralement avec eux et leur raconte des histoires traditionnelles qu'ils écoutent attentivement. Mais ces temps-ci, ses histoires sont souvent interrompues par des douleurs à la poitrine et une forte toux. Parfois elle crache sur les cendres près du feu et observe souvent du sang dans ses expectorations. Mais les enfants, curieux, attendent qu'elle finisse les histoires. Lorsqu'elle se sent mieux, elle continue son récit.

Questions pour mener une discussion

1. Quelle est votre opinion au sujet du rapport qu'Amina a avec ses voisins en ce qui concerne la transmission de TP ?
2. Que pensez-vous du fait que les jeunes enfants viennent écouter les histoires d'Amina tout près d'elle ?
3. Le conseil donné par les voisins au sujet de sa maladie "Dhukuba Qilensa " est-il pertinent ?
4. Quel conseil donneriez-vous aux membres de la communauté du village d'Amina et à Amina ?
5. Quelles mesures environnementales suggèreriez-vous pour empêcher la transmission de maladies dans des cas similaires à celui d'Amina ?

3.3.4 Prévention et Contrôle

Les éléments d'un programme de contrôle solide seront basés sur tout ce qui est su de l'épidémiologie, de la pathogenèse, et des aspects cliniques et bactériologiques de la maladie.

Les mesures spécifiques pour contrôler la TP sont celles qui :

Améliorent la résistance à cette maladie,

Permettent un diagnostic précoce,

Empêchent la propagation de l'infection, et

Fournissent des traitements appropriés et permettent la réhabilitation des patients.

Port de masques respiratoires :

L'idéal serait que les patients portent des masques constamment, mais il est peu probable qu'ils acceptent de le faire. Le fort volume de sécrétions libéré par une toux violente ne peut être totalement bloqué par le port de masques qui, de plus, sont humidifiés par des sécrétions potentiellement infectieuses et deviennent ensuite de véritables pulvérisateurs lorsqu'ils sont frappés par l'air expulsé quand le patient tousse. Par conséquent, les masques ne sont pas une forme appropriée de contrôle à la source, mais ils peuvent servir à diminuer le risque de transmission à d'autres personnes. Un patient tuberculeux ou susceptible de l'être devrait donc dans la mesure du possible porter un masque lorsqu'il se déplace d'un endroit de l'hôpital à l'autre. Les agents de santé portent souvent des masques pour se protéger de la TP, par exemple quand ils travaillent dans le pavillon des tuberculeux. En réalité un masque n'est généralement pas très efficace lorsqu'il s'agit de protéger la personne qui le porte contre l'inhalation de gouttelettes infectieuses produites par d'autres personnes.

3.3.4.2 Le Contrôle Environnemental

Figure3.3.1 De meilleures conditions de vie diminuent la transmission de la TP.

Ventilation adéquate :

La ventilation des pièces, qu'elle soit obtenue par l'ouverture des fenêtres ou par l'utilisation de bouches d'aération, permet d'évacuer vers l'extérieur les micro-organismes qui se trouvent dans l'air de la pièce et de diluer ceux qui restent dans l'air pur venu du dehors. Une ventilation performante et adaptée contribue à réduire la transmission de la TP à l'intérieur.

Il y a deux façons d'aérer les pièces : la ventilation naturelle et la ventilation mécanique (aspirante).

La ventilation naturelle se fait au moyen de portes et fenêtres ouvertes de deux façons :

- Aération latérale : les fenêtres ou portes d'une pièce sont face à face ou parallèles les unes par rapport aux autres.
- Aération diagonale : Les fenêtres ou les portes ouvertes sont placées en diagonale, c'est-à-dire sur deux murs adjacents.

La ventilation aspirante est un système permettant d'expulser l'air pollué hors d'une pièce, en utilisant des méthodes mécaniques comme des ventilateurs, tout en le remplaçant par de l'air pur. L'air des chambres d'isolement doit être évacué vers l'extérieur ou désinfecté avant d'être réutilisé. L'air doit circuler entre les couloirs et les chambres d'isolement, et lorsque cela n'est pas possible, l'air des chambres et du couloir doit être désinfecté

Eviter le surpeuplement :

Le surpeuplement est un problème environnemental qui augmente les risques de transmission de la tuberculose pulmonaire. Associé à une mauvaise ventilation, le surpeuplement facilite l'inhalation de l'organisme ; la transmission peut avoir lieu directement d'une personne à l'autre ou indirectement par le biais de l'air pollué de la chambre. Par conséquent, la prise en compte de la nécessité d'un espace suffisant pour chaque patient est essentielle pour prévenir la transmission de la maladie.

N.B. L'idéal en termes d'espace de vie dans le logement est de 1,5 personnes par pièce de vie, pour obtenir un taux de volume d'air par pièce acceptable. L'espace de vie et de sommeil recommandé est de 2 à 3 m^2 d'espace au sol par adulte. Nos formations santé doivent donc s'efforcer de faire prendre conscience de cet objectif.

des cas de TP. Le BCG n'est pas la seule immunisation proposée par le PEI pouvant contribuer à protéger un enfant de la TP. La rougeole et la coqueluche diminuent la résistance des enfants et peuvent les prédisposer à la TP. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que des enfants se présentent dans des établissements de santé, leur carnet de vaccination doit être vérifié. S'ils n'ont pas reçu les vaccins prévus, encouragez les mères à finir le programme de vaccination.

3.3.4.5 Formation santé

Figure 3.3.2 Une bonne formation santé garantit l’implication de la communauté.

Formation santé du patient:

Formation en santé publique :

La formation du patient, de sa famille, de ses connaissances, des agents de santé et plus généralement des membres de la collectivité sur la maladie comme problème de santé publique et sur l'importance de trait 80C0.04 Tm fp t es(es)-2ntabesolent1néess(i)3rme

3.4 Module satellite pour les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale

3.4.1 Comment utiliser ce module

Avant de lire ce module satellite assurez-vous que vous avez répondu à toutes les questions du test préliminaire et étudié le module central.

Poursuivez la lecture de ce module satellite.

3.4.2

Le bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis) est un organisme non-capsulé en forme de bâtonnet droit ou légèrement incurvé. L'organisme est difficile à colorer par la coloration de Gram à cause de la résistance de sa paroi cellulaire. Cependant, lorsqu'il est coloré avec la coloration de Ziehl-Neelsen, l'organisme devient rouge et est acido-alcoolo résistant (BAAR), ce qui constitue sa caractéristique la plus importante. L'acido-alcoolo résistance implique que lorsque l'organisme est coloré par la fuchsine de Ziehl, il garde cette coloration rouge lorsqu'il est rincé avec une solution acide. L'acido-alcoolo résistance des bacilles est due à l'épaisseur de leur paroi cellulaire, constituée de cire et de lipides qui présentent une forte concentration d'acides gras mycoliques. C'est la raison pour laquelle on utilise la coloration de Ziehl-Neelsen pour colorer le bacille.

N.B L'apparence physique des expectorations (observation macroscopique) doit être consignée. Les descriptions possibles portent sur la couleur et la consistance (claire, muqueuse, muco-purulente, purulente et sanglante)

La coloration Ziehl-Neelsen

Cette technique est la méthode de recherche des BAAR à partir de frottis d'expectorations la plus utilisée dans les petits laboratoires.

- Principe du test

Un frottis est réalisé sur une lame et fixé pour éviter que l'échantillon ne soit évacué par le rinçage. La lame est ensuite chauffée pour faire fondre la substance cireuse de la paroi cellulaire de la bactérie, ce qui permet à la coloration de pénétrer à l'intérieur des organismes et des les colorer.

A. Méthode directe

Protocole

1. A l’aide d’un écouvillon, transférer une partie purulente des expectorations sur une lame et faire un frottis fin. Si les expectorations contiennent de gros caillots sanguins, transférer une partie de l’échantillon dans un autre récipient et ajouter quelques gouttes de solution saponine pour lyser les caillots et libérer les organismes.
2. Laisser sécher le frottis à l’air dans un lieu sûr.
3. Fixer le frottis avec une ou deux gouttes d’une solution d’éthanol ou de méthanol à 70% pendant deux ou trois minutes ou en passant la lame à peu près trois fois au-dessus d’une flamme.

NB On considère qu'une personne est atteinte de tuberculose si au moins deux lames sont positives pour le BAAR sur les trois prélèvements

3.5 Module Satellite pour les agents de santé communautaire

3.5.1 Introduction

3.5.1.1 Objectifs et utilisation du module

Ce module s'adresse aux agents de santé communautaire. Son ambition est de leur fournir l'information de base requise au niveau populaire pour servir la collectivité en prévenant et en contrôlant la tuberculose pulmonaire (TP). Il les aide à prendre conscience du rôle qu'ils peuvent jouer dans la prévention de la maladie en détectant et en prenant en charge les cas.

3.5.1.2 Comment utiliser ce module.

Commencez avec les questions du test préliminaire. Répondez sur une autre feuille.
Puis étudiez ce module, y compris l’analyse des tâches.

3.5.3 Objectifs pédagogiques

Grâce au module, le lecteur sera capable de :

Savoir que la TP est une maladie importante pour la santé publique.

Identifier les causes et le mode de transmission de la tuberculose pulmonaire.

Savoir que la TP peut être guérie.

Participer à la prévention et au contrôle de la TP.

3.5.4 Importance du problème

Le problème posé par la tuberculose pulmonaire, dans le monde en général et en Éthiopie en particulier, devient de plus en plus important, malgré les efforts déployés pour alléger le fardeau qu'il fait peser sur le développement socio-économique. Cette aggravation peut être due au surpeuplement, à de mauvaises conditions de logement et de ventilation, à la malnutrition, à un manque de lumière du soleil dans les maisons, à des services de santé peu performants, à des maladies comme le VIH/SIDA et à un manque d'information des populations quant aux causes et aux moyens de prévention de la maladie.
De ce fait, la maladie cause un grand nombre de morts dans les catégories de population productives utiles au développement socio-économique.

3.5.5 Définition, cause et développement de la tuberculose pulmonaire

3.5.5.1 Définition

La tuberculose pulmonaire est une maladie des poumons. Elle est provoquée par des microbes. Les microbes sont de très petits organismes vivants qui ne peuvent être aperçus à l'œil nu.

3.5.5.2 Développement de la maladie

Les microbes qui provoquent la maladie après avoir été inhalés avec l'air que l'on respire entrent dans les poumons des personnes saines en même temps que l'air qu'elles respirent. Les microbes se multiplient dans les poumons et les détruisent. Ainsi de nouvelles personnes tombent malades.

3.5.6 Localisation et fonction des poumons humains

Les humains ont deux poumons dans leur cage thoracique : le poumon droit et le poumon gauche. Les poumons permettent d'inspirer et expirer l'air atmosphérique. Lorsque des microbes attaquent les poumons, le patient a des difficultés respiratoires et peut en mourir s'il ne reçoit pas un traitement médical approprié.

3.5.7 Mode de transmission et fréquence de la maladie en Éthiopie

La tuberculose pulmonaire est transmise lorsqu'un patient tousse, éternue ou crache. Ce faisant, le patient expulse des microbes dans l'air, et lorsqu'une autre personne inhale cet air, les microbes entrent dans ses poumons en même temps que l'air et une infection se développe.
La maladie est très rép3aison e4 ais(6.28t)4(r)-7

. Connaître les mesures de prévention les plus importantes de la TP.	- Savoir que le fait de traiter tôt et de façon adaptée les cas actifs de TP est une mesure de contrôle importante. - Savoir qu'il faut se couvrir la bouche pour tousser et éternuer. - Etudier l'importance d'une bonne ventilation et de la présence de la lumière du soleil dans les espaces de vie, ainsi que le besoin de lutter contre la surpopulation. - Etudier l'importance des formations santé de la communauté, y compris la nécessité des vaccinations et d'une alimentation correcte.

Tableau 3.5.2. Attitude à avoir - objectifs et activités

Objectifs pédagogiques	Activités
Comprendre que la TP est évitable,	

- **Vous avez maintenant terminé le module. Faites maintenant le test préliminaire comme test d'évaluation.**
- **Répondez sur une autre feuille.**
- **Pour finir, comparer vos réponses aux tests préliminaire et d'évaluation grâce au corrigé section 3.5.13 et évaluez vos progrès.**

PARTIE 4

ANALYSE DES ROLES ET TACHES POUR LES MEMBRES DE L'EQUIPE DU CENTRE DE SANTE

Tableau 4.1 Connaissances -

Objectifs pédagogiques	Activités pédagogiques			
	HO	**PHN**	**EHT**	**MLT**
Décrire l'impact mondial du problème de la TP et son importance en santé publique en Ethiopie	- Etudier l'épidémiologie - Connaître les modes de transmission - Etudier les raisons de la prévalence élevée de la maladie	- Etudier l'épidémiologie - Connaître les modes de transmission - Etudier les raisons de la prévalence élevée de la maladie	- Etudier l'épidémiologie - Connaître les modes de transmission - Etudier les raisons de la prévalence élevée de la maladie	- Etudier l'épidémiologie - Connaître les modes de transmission - Etudier les raisons de la prévalence élevée de la maladie

Décrire le programme national de lutte contre la TP	- Connaître les méthodes de lutte contre la TP - Détection des cas - Examen médical et recherche des contacts - Chimiothérapie - Recherche des cas d'abandon - Signaler les cas - Surveillance et monitoring	- Connaître les méthodes de lutte contre la TP - Détection des cas - Examen médical et recherche des contacts - Chimiothérapie - Recherche des cas d'abandon - Signaler les cas - Surveillance et monitoring	- Connaître les méthodes de lutte contre la TP - Détection des cas - Examen médical et recherche des contacts - Chimiothérapie - Recherche des cas d'abandon -	- Signallan

Tableau 4.2 Attitude à avoir-Objectifs et activités.

Objectifs pédagogiques	Activités pédagogiques			
	HO	**PHN**	**EHT**	**MLT**
Savoir que la TP est un problème de santé publique majeur	- Souligner l'impact social, économique et sur la santé de la TP	- Souligner l'impact social, économique et sur la santé de la TP	- Souligner l'impact social, économique et sur la santé de la TP	- Souligner l'impact social, économique et sur la santé de la TP
Savoir que les mesures de prévention et de contrôle freinent la transmission de la TP	- Souligner l'importance de la formation santé	- Souligner l'importance de la formation santé	- Souligner l'importance de la formation santé	- Souligner l'importance de la formation santé
Savoir que la recherche de BAAR dans les expectorations est une étape clé dans le diagnostic de la TP	- Souligner l'importance de la recherche de BAAR dans les expectorations	- Souligner l'importance de la recherche de BAAR dans les expectorations	- Souligner l'importance de la recherche de BAAR dans les expectorations	- Souligner l'importance de la recherche de BAAR dans les expectorations
Savoir que la TP est évitable, curable et guérissable.	- Souligner l'importance de la formation santé	- Souligner l'importance de la formation santé	- Souligner l'importance de la formation santé	- Souligner l'importance de la formation santé
Comprendre le lien entre la TP et le VIH/SIDA	- Sensibiliser les communautés au VIH/ SIDA	- Sensibiliser les communautés au VIH/ SIDA	- Sensibiliser les communautés au VIH/ SIDA	- Sensibiliser les communautés au VIH/ SIDA

Tableau 4.3 Gestes à accomplir – Objectifs et activités

Objectifs pédagogiques	Activités pédagogiques			
	HO	**PNH**	**EHT**	**MLT**
Effectuer les examens de laboratoire appropriés	- Faire la coloration pour le BAAR - Interpréter les résultats - Noter et transmettre les résultats	- Prélèvement des échantillons d'expectorations et enregistrement des données - Notation des résultats des examens de laboratoire	- Animer des formations santé sur la nécessité des examens de laboratoire.	- Prélever des échantillons d'expectorations - Désinw 5.020 9.96 609.48 454.56 Tm [(6

Objectifs pédagogiques	Activités pédagogiques			
	HO	PHN	EHT	MLT
Effectuer les mesures de				

PARTIE 5

GLOSSAIRE

Bouche d'aération	- Une ouverture ou un trou permettant à l'air de passer.
Atomiser	- Réduire en fines particules.
Bactéricide	- Qui tue les microorganismes pathogènes ou potentiellement pathogènes par l'application d'agents chimiques ou biologiques.
Bactériostatique	- Qui prévient la croissance et la multiplication de microorganismes pathogènes ou potentiellement pathogènes.
B.C.G	- (Bacille de Calmette et Guérin) Vaccin préparé à base de Mycobacterium bovis, et utilisé pour protéger les jeunes enfants contre la survenue d'une tuberculose grave ou disséminée.
Biseau	- Partie oblique d'une aiguille
Décantation	- Action d'éliminer le liquide surnageant après centrifugation d'une substance donnée.
Désinfection	- Elimination sélective de certains organismes indésirables pour prévenir leur transmission.
Stérilisation	- Elimination de toute forme de microorganisme.
Stérilisation RUV	- (Stérilisation par rayonnement ultraviolet) technique pour tuer les microbes (microorganismes) via l'utilisation de la lumière du soleil, qui est une source de rayons ultraviolets.
Ventilation	- Action de produire une circulation d'air, vers ou depuis un lieu donné, par les forces naturelles de la diffusion de l'air ou l'utilisation d'un dispositif mécanique.
Vortex	- Appareil utilisé pour mélanger deux substances (liquides) différentes. Ex : expectorations et « barakina ».
Chimiothérapie	- Thérapie avec des médicaments chimiques.

REGION	TP+ AGE < 15an		TP+ : THERAPIE PRESCRITE				PRELEVEMENT D'EXPECTORATIONS TRIMESTRE PRECEDENT							A 2 MOIS DES CAS DE TP+ DOCUMENTES	
	P+<15a	%Nv	SCC	% Nv	LCC	%Nv	Doc	Fait	% Doc	Pos %	%Fait	Neg	%Fait	N.F.	%Doc
Tigré	80	4%	1817	99%	16	1%	1752	1440	82%	47	3%	1393	97%	312	18%
Amhara	316	6%	4303	80%	1077	20%	3950	3091	78%	144	5%	2947	95%	859	2%
Oromia	752	7%	10612	99%	101	1%	10588	8032	76%	176	2%	7856	98%	2556	24%
Somali	123	8%	1535	95%	87	5%	1442	1331	92%	173	13%	1158	87%	111	8%
SNNP	641	8%	7439												

Pulmonary Tuberculosis Module

REGION	PATIENTS RECEVANT UNE CHIMIOTHERAPIE DE LONGUE DUREE												
	TOTAL	Guéri	Fini	Réussite	Taux	Décès	%	Echec	%	Abandon	%	Transfert	%
Tigray	26	18	5	23	88%	1	5%	0	0%	2	8%	0	0%
Amhara	522	82	246	328	63%	24	5%	9	2%	142	27%	19	4%
Oromiya	1315	512	384	896	68%	57	4%	7	1%	292	22%	65	5%
Somali	12	3	3	6	50%	0	0%	1	8%	1	8%	0	0%
SNNP	2173	589	901	1490	69%	100	5%	27	1%	336	15%	90	4%
Harari	-	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Dire Dawa	-	-	-	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Addis Ababa	17	13	-	13	76%	0	0%	2	12%	0	0%	2	12%
Total	4065	1217	1539	2756	68%	182	4%	46	1%	773	19%	176	4%

SCC+LCC	23656	13568	4628	18196	77%	1588	7%	272	1%	2897	12%	883	4%

SNNP =

REGION	PATIENTS RECEVANT UNE CHIMIOTHERAPIE DE SECONDE INTENTION													INSCRITS
	TOTAL	Guéri	Fini	Réussite	Taux	Décès	%	Echec	%	Abandon	%	Transfert	%	
Tigré	43	27	3	30	70%	8	19%	2	5%	3	7%	0	0%	43
Amhara	80	16	40	56	70%	6	8%	1	1%	10	13%	1	1%	8010

Annexe III

Régime thérapeutique recommandé par le TLCT (Service de contrôle et de prévention de la tuberculose et de la lèpre), Ministère de la Santé.

Tableau 7.3 Stratégie DOTS : Pharmacothérapie sous surveillance directe de courte durée: 2S (RHZ) /6 (EH).

Durée du traitement	**Médicaments**	**Poids des Adolescents et Adultes avant le traitement**			
		20-29kg	**30-37kg**	**38-54kg**	**>55kg**
Phase Intensive (8 semaines)	(RHZ 150/75/400)	1½	2	3	4
	S	0,50gm	0,75gm	0,75gm	1gm
	Ou	Ou	Ou	Ou	Ou
	E400	1	1½	2	3
Phase d'entretien (6 mois)	(EH 400/150)	1	1½	2	3

Abréviations:

RH 150/75 Comprimé contenant 150 mg dTJ 0.007 Tw 8 re f* 450.6 426.84 53.4 0.48 re f* 50f 0 96 f*

Tableau 7.4

Tableau 7.5 Régime thérapeutique de longue durée pour la tuberculose : 2S(TH)/ 10(TH) ou 2S(EH)/10(EH)

Durée du traitement	Médicaments	Poids de l'enfant avant le début du traitement		Poids des Adolescents et Adultes avant le traitement			
		< 9kg	10 -19kg	20-29kg	30-37kg	38-54kg	>55kg

Partie II (section 2.1.2)

Réponses aux tests préliminaire et d'évaluation spécifiques aux catégories professionnelles de l'équipe du centre de santé.

Pour les agents de santé (section 2.1.2.1)

1. Faux

Pour les infirmières de santé publique (section 2.1.2.2.)

1. Faux
2. Faux
3. Faux
4. a. Isoniazide (H)
   b. Rifampicine (R)
   c. Pyrazinamide (Z)
   d. Streptomycine (S)
   e. Ethambutol (E)
   f. Thioacétazone
5. Pour les effets secondaires mineurs :
   a. Avec des effets secondaires qui persistent trois à cinq jours, interrompre provisoirement le traitement.
   b. Traiter les symptômes.
   c. Rétablir le traitement dès que les effets secondaires disparaissent. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Gestes à accomplir pour les réactions majeures

a. Interrompre le traitement
b. Appeler un médecin pour consultation.
c. Aiguiller le patient pour admission à l'hôpital.

Pour les agents d'hygiène communautaire (Inspecteurs en santé publique) (section 2.1.2.3)

1. C
2. C
3. B
4. C
5. a. Contrôle au niveau du cas source
   b. Contrôle environnemental
   c. Traitement
   d. Vaccination par le BCG
   e. Formation santé
6. Se couvrir la bouche pour tousser et éternuer ou traitement.
7. a. Ventilation
   b. Eviter le surpeuplement
   c. Exposition à la lumière du soleil.
8. a. Raconter une histoire
   b. Utiliser des mots simples
   c. Montrer/démontrer quelque chose
   d. Chanter des chansons
   e. Utiliser le théâtre ou des jeux de rôle
   f. Encourager la discussion

Pour les techniciens de laboratoire (section 2.1.2.4)

1. Faux
2. Vrai
3. Faux
4. Vrai
5. Faux
6. Faux
7. Faux
8. Vrai
9. a. Bonne identification des patients et explication des procédures
   b Utilisation d'échantillons non formés de salive
   c. Vérifications de la qualité des solutions colorantes
   d. Examiner au moins 100 champs (pendant 5 minutes) avant de transmettre le résultat.
10. a. Fuchsine de Ziehl e

Les auteurs

Melake Demena est professeur adjoint et doyen de la Faculté de sciences médicales de l'Université d'Alemaya. Il a obtenu sa licence (B.Sc.) de Santé Publique à l'ancien Collège de Santé Publique de Gondar (aujourd'hui Collège de Sciences Médicales de Gondar) et son Master en Santé Publique à l'Université d'Addis Abeda. Il fait partie du programme de mobilisation sociale de l'UNICEF.

Negga Baraki est doyen adjoint de la Faculté des sciences médicales et enseignant au Département de santé environnementale de la Faculté des sciences médicales de l'Université d'Alemaya. Il a obtenu son diplôme en sciences sanitaires à l'ancien Collège de Santé Publique de Gondar (aujourd'hui Collège de Sciences Médicales de Gondar), sa Licence à l'ancien Institut de sciences médicales de Jimma et son Master en santé publique au University College de Dublin, en Irlande.

Yared Kifle est professeur adjoint au Département des soins infirmiers de la Faculté des sciences médicales de l'Université d'Alemaya, après avoir été directeur de ce département. Il a obtenu son diplôme en soins infirmiers à l'École de soins infirmiers de Nekemt et sa Licence à l'ancien Institut de sciences médicales de Jimma (aujourd'h